

四川青脚麻鸡苗 四川青脚麻鸡苗批发 成都青脚麻肉鸡苗孵化场 土鸡苗价格

产品名称	四川青脚麻鸡苗 四川青脚麻鸡苗批发 成都青脚麻肉鸡苗孵化场 土鸡苗价格
公司名称	贵州伟静鸿禽业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 (kg) 贵阳:98 (%)
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	17369032651 13547864653

产品详情

这个时期产蛋维持在水平，虽然此时鸡的体重增长减缓，但蛋重仍在增加，因此，营养水平仍需保持在状态，光照时间和光照强度维持不变，使产蛋高峰期延长。

(1)保持良好的饲养环境：产蛋鸡适宜的温度为13-24，适宜的湿度60-65%，加强通风换气，保证舍内空气新鲜，提供充足饲料、饮水，准时喂料、匀料，开、关灯时间准确。

(2)减少对鸡群的干扰，减少各种应激，为鸡群创造安静的环境。

(3)产蛋高峰期间母鸡繁殖机能旺盛、代谢强烈，抵抗力较弱、易得病，要特别注意鸡群的健康状况，保持环境和饲料的卫生，避免鸡群受到病原微生物的感染。

(4)产蛋高峰期间应定期添加复合维生素和抗菌消炎药，减少应激对产蛋造成的影响和产蛋对输卵管造成的损害，以稳定产蛋和提高种蛋合格率。

3.产蛋高峰期后的管理

产蛋高峰期后产蛋率开始逐渐下降，为了进一步稳定产蛋成绩，维持三高指标(高产蛋率、高受精率、高成活率)，此时，高峰期后要相应减少营养供应，防止母鸡营养过剩，体内脂肪过度积累使体重增长过快，造成产蛋率、受精率急剧下降、母鸡死亡率上升。

(1)产蛋高峰期到达以后，产蛋率5-6天不再上升，应开始试探性减料2-3克，然后观察种鸡的产蛋率和体重变化，如无异常，以后每2周减料0.5-1克，如产蛋下降过快，应暂缓减料或恢复到前一周喂料量水平。

(2)产蛋高峰以后，每2周对鸡群体重、蛋重作跟踪抽称，为了所得数据更具代表性，可固定多点取样，称重一般在下午进行，保持产蛋高峰后每周增重幅度相对合理、一致。正常型配套每周增重幅度约10-20

克，矮小型配套每周增重幅度约5-10克。

(3)如遇因气候突变，光照、饲养和健康等原因引起产蛋下降时应立即减少给料，待消除上述不利应激因素，观察2-3周，视产蛋恢复情况和体重增加情况，再决定减料和减料幅度。

(4)产蛋后期母鸡吸收钙的能力减弱，应定期为母鸡补充钙源如贝壳粉、石粉粒等，提高后期种蛋合格率。

(5)及时淘汰、出售停产、低产蛋鸡只。及时淘汰病残鸡只。

4.产蛋鸡日常管理要点

(1)经常巡查鸡群，注意光照、喂料、饮水、疾病等情况，及时排查处理。

(2)减少应激(高峰期的鸡脆弱)。

应激产生的原因：产蛋、抓鸡、打针、停水、光照、飞鸟

应激造成的影响：食欲、产蛋下降、软蛋多、易惊群

(3)做好产蛋、防疫、用药、用料等日常生产记录。

5.种蛋管理

(1)正确集蛋和种蛋消毒有利于提高孵化率和生产健康的雏鸡。

(2)种蛋的收集、包装、运输都必须保持大头朝上，种蛋的大小、形状要合适，蛋壳致密、均匀、无裂纹、表面清洁，壳厚正常，蛋壳颜色应符合品种标准。

(3)种蛋用2倍量福尔马林熏蒸消毒，20分钟后通风，消毒后转入蛋库储存。

种蛋储存、运输需要合适环境条件，种蛋保存一周以内，15-16℃ 合适，保存一周以上以12℃ 为宜，蛋库的湿度以70-80%较佳。种蛋保存时间愈短愈新鲜，孵化率愈高，一般保存3-5天能取得良好孵化成绩。种蛋运输时注意包装完善，轻装轻卸，以免震动碰破。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗，K901鸡苗，麻黄鸡苗，快大麻鸡苗批发