

临沧土鸡苗批发 临沧青脚麻鸡苗价格 新广麻黄K901鸡苗供应 882鸡苗 本地鸡苗

产品名称	临沧土鸡苗批发 临沧青脚麻鸡苗价格 新广麻黄K901鸡苗供应 882鸡苗 本地鸡苗
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:5.2 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

加强饲养管理：保持鸡舍干燥、通风和鸡场卫生，定期清除粪便，堆放;发酵以杀灭卵囊。保持饲料、饮水清洁，笼具、料槽、水槽定期消毒，一般每周一次，可用沸水、热蒸气或3%~5%热碱水等处理。据报道：用球杀灵和1 200的农乐溶液消毒鸡场及运动场，均对球虫卵囊有强大杀灭作用。每千克日粮中添加0.25~0.5mg硒可增强鸡对球虫的抵抗力。补充足够的维生素K和给予3~7倍推荐量的维生素A可加速鸡患球虫病后的康复。

免疫预防：据报道，应用鸡胚传代致弱的虫株或早熟选育的致弱虫株给鸡免疫接种，可使鸡对球虫病产生较好的预防效果。亦有人利用强毒株球虫采用少量多次感染的涓滴免疫法给鸡接种，可使鸡获得坚强的免疫力，但此法使用的是强毒球虫，易造成病原散播，生产中应慎用。此外有关球虫疫苗的保存、运输、免疫时机、免疫剂量及免疫保护性和疫苗安全性等诸多问题，均有待进一步研究。

药物防制：迄今为止，国内外对鸡球虫病的防制主要是依靠药物。使用的药物有化学合成的和抗生素两大类，从1936年首次出现专用抗球虫药以来，已报道的抗球虫药达40余种，现今广泛使用的有20种。中国养鸡生产上使用的抗球虫药品种，包括进口的和国产的，共有十余种。

氯苯胍：预防按30 ~ 33

mg/kg浓度混饲，连用1 ~ 2个月，治疗按60 ~ 66mg/kg混饲3 ~ 7d，后改预防量予以控制。

氯羟吡啶(可球粉，可爱丹)：混饲预防浓度为125 ~ 150

mg/kg，治疗量加倍。育雏期连续给药。

氨丙啉：可混饲或饮水给药。混饲预防浓度为100 ~ 125mg/kg，

连用2 ~ 4周；治疗浓度为250 mg/kg，连用1 ~ 2周，然后减半，连用2 ~ 4周。应用本药期间，应控制每千克饲料中维生素B1的含量以不超过10 mg为宜，以免降低药效。

用加强氨丙啉预防，按66.5 ~ 133 mg/kg浓度混饲，治疗浓度加倍。氨丙啉和特氨丙啉的用法同加强氨丙啉，但产蛋鸡限用。

硝苯酰胺(球痢灵)：混饲预防浓度为125 mg/kg, 治疗浓度为250 ~ 300

mg/kg，连用3 ~ 5d。

呋喃唑酮(痢特灵)可混饲或饮水给药。预防浓度为100 ~ 200 mg/kg, 连用1

周，停药2 ~ 3d，如此重复使用；治疗浓度为300 ~ 400

mg/kg，连用1周，再改用预防量。使用本药必需注意与饲料或饮水混合均匀。

莫能霉素：预防按80 ~ 125 mg/kg浓度混饲连用。与盐霉素合用有累加作用。

盐霉素(球虫粉，优素精)：预防按60 ~ 70 mg/kg浓度混饲连用。

奈良菌素：预防按50 ~ 80 mg/kg浓度混饲连用。与尼卡巴嗪合用有协同作用。

马杜拉霉素(抗球王、杜球、加福)：预防按5 ~ 6 mg/kg浓度混饲连用。

阿波杀：按40 ~ 60 mg/kg浓度混饲或饮水给药均可。

常山酮(速丹)：预防按3 mg/kg浓度混饲连用至蛋鸡上笼，治疗用6 mg/kg混饲连用1周，后改用预防量。

尼卡巴嗪：混饲预防浓度为100 ~ 125mg/kg，育雏期可连续给药。

杀球灵：主要作预防用药，按1 mg/kg浓度混饲连用。

百球清：主要作治疗用药，按25 ~ 30 mg/kg浓度饮水，连用2d。

磺胺类药：对治疗已发生感染的优于其他药物，故常用于球虫病的治疗。常用的磺胺药有：复方磺胺-5-甲氧嘧啶(SMD-TMP)，磺胺喹恶啉(SQ)，磺胺间二甲氧嘧啶(SDM)，磺胺间六甲氧嘧啶(SMM，DS—36，制菌磺)，磺胺二甲基嘧啶(SM2)，磺胺氯吡嗪，磺胺增效剂—二甲氧苄氨嘧啶(DVD)或三甲氧苄氨嘧啶(TMP)。