

# 甘肃武威鸡苗批发市场 天水土鸡苗价格 定西三黄鸡苗 陇南青脚麻鸡苗 临夏土鸡苗

产品名称	甘肃武威鸡苗批发市场 天水土鸡苗价格 定西三黄鸡苗 陇南青脚麻鸡苗 临夏土鸡苗
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 ( kg ) 成都:98 ( %
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

## 产品详情

### 一 管理因素

#### 1温、湿度

当冬季鸡舍温度低于20℃，或非常干燥时，因球虫卵囊孢子化不良，鸡球虫病的发生也随之减少；在高温和高湿的夏季，鸡球虫病的发病率较高，特别是在南方湿度大的梅雨季节前后为多发时期，此期，由于垫料较潮湿，球虫病会反复发作。

#### 2卫生、防疫

加强卫生消毒、合理防疫。小型鸡场和养鸡专业户由于鸡场条件差，技术力量薄弱，对球虫病不够重视，容易暴发球虫病。

#### 3 间断光照

间断光照比连续光照感染球虫的危险性要高些，原因是前者会造成鸡积极翻动垫料而致感染机会增加，翻动垫料也改善了卵囊孢子化条件。

#### 4垫料

垫料的管理在控制球虫病上具有重要意义，垫料的管理不可忽视，其总的要求是：松、干

、薄。

## 5 密度

高密度饲养是一种不良致病因素，当密度过大，鸡舍内空气较差，球虫病的发病率较高。高密度鸡群会造成卵囊密度增加，而致感染机会提高。

## 6 饲养方式

饲养方式不同可引起对球虫病感染的显著差别，对网上饲养的鸡群而言，感染球虫病的机会是极低的。这主要是网上饲养的鸡不容易接近地面感染源的原因。

## 二 饲料因素

饲料中的各种抗营养因子，如单宁酸、植酸、棉酚和抗胰蛋白酶等，易与肠壁黏膜结合，导致肠壁的损伤，饲料中电解质平衡失调，使排泄的粪便湿度增加，都使球虫病的发生率提高；饲料中维生素A和维生素K缺乏，使消化道黏膜和血液凝固机制受损，容易遭受球虫病的侵袭；限制饲养时，鸡由于饥饿，啄食垫料，感染的机会增加，也会提高发病率。优质全价饲料能提高机体对球虫病的抵抗能力，蛋白质、维生素、无机盐等饲料组分在控制球虫病上具有重要意义，饲喂粗砂粒、颗粒饲料及