

贵州地区鸡苗批发点 土鸡苗 新广K901鸡苗 K9鸡882鸡苗 贵阳青脚麻鸡苗

产品名称	贵州地区鸡苗批发点 土鸡苗 新广K901鸡苗 K9鸡882鸡苗 贵阳青脚麻鸡苗
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 (kg) 成都:98 (%
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

1. 对球虫免疫首免日龄的确定。建议越早越好，越早越有利于鸡只在自然感染前建立坚强的免疫力，并且幼龄鸡对球虫的感染性低、对生长速度和肉料比的影响小，因此一般不晚于3日龄。
2. 免疫方法的选择。以滴口法为，可确保免疫，但对于大鸡场则有些不便，且应激大；喷雾法较适用于设备先进的孵化室，对种鸡场不适用；饮水法和喷料法是大鸡场较为适用的。
3. 球虫免疫后的垫料管理至关重要。垫料太干，球虫卵囊不孢子化，鸡群得不到反复免疫；垫料太湿，卵囊孢子化的数量太多，易使免疫力尚未充分建立的鸡群引发球虫病，因此上层垫料的湿度是25%~30%。根据经验，其判别标准是在鸡舍中选取几个点，抓起一把垫料，把手松开，手心感觉有点潮，说明垫料湿度适合；手心感觉有点湿，说明垫料太潮湿；手心感觉有点干，说明应增加湿度。在免疫期间，上层垫料要经常翻动保证疏松，不得出现结饼现象，育雏期间不许大面积更换垫料。
4. 球虫免疫后2周内在饲料或饮水中应添加维生素A和维生素K，以防止维生素A的缺乏和减少肠道出血等免疫反应。
5. 球虫活疫苗的保存。球虫疫苗对温度较敏感，高温和冷冻都将杀死疫苗，应保存在2~8℃下，使用时所用稀释液应在20℃左右。
6. 免疫接种后3周内不准用任何抗球虫药物及某些抗菌药物，例如痢特灵、土霉素、四环素、磺胺类等。免疫后10天内反应较大（如出现血便）可用 60×10^{-6} 氨丙啉饮水2天，或用1/3量的百球清饮水一次（如未观察到血便可不用本步骤）抑制一下球虫第二代裂殖体的增殖，并可用一些不杀伤球虫的抗生素和止血药以抑制继发感染和止血，防止免疫失败和过度。
7. 鸡群免疫后第3~6天应扩栏，不要让接种后的鸡圈养在小保温区内超过7天，以免出现免疫反应过重的现象。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗，K901鸡苗，麻黄鸡苗，快大麻鸡苗批发