

# 土鸡养殖技术 散养土鸡苗的养殖与管理技术 四川土鸡苗供应批发

产品名称	土鸡养殖技术 散养土鸡苗的养殖与管理技术 四川土鸡苗供应批发
公司名称	贵州伟静鸿禽业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:5.2 ( kg ) 贵阳:98%
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	17369032651 13547864653

## 产品详情

1.1合理选址，做好鸡舍改造建设。鸡舍必须建在地势高、排水方便、通风良好的地方，不宜在低洼潮湿处建场;鸡舍前后可每隔3m开一个70cm×120cm的采光透风窗，室内一侧放置栖架，饮水器、料槽等差距分布于舍内，同时在向阳面的一边开一个高160cm、宽70cm的小门，门外设置铺有沙子的运动场。鸡舍内应是水泥地面，以利于清扫与消毒。另外，要加强绿化，以净化鸡舍环境。

1.2做好鸡舍及用具的消毒，保持鸡舍干净卫生。鸡舍要保温良好，干燥卫生，光亮适度，通风换气。地面用生石灰铺撒或用10%生石灰乳喷洒消毒，有条件的可用高压水冲洗，喷灯火焰消毒。舍内四周墙壁、烟道等用10%生石灰乳刷白，然后按每立方米用福尔马林溶液15ml、高锰酸钾7.5g进行熏蒸，密闭1~2d后开窗通风换气。鸡舍附近的运动场，在使用前也要进行消毒处理。伞型育雏器、笼具、料槽、饮水器等用1%苛性钠溶液或可用10%生石灰乳剂清洗消毒，然后用水仔细冲洗干净，在日光下晒干备用。

1.3做好通风换气工作，使土鸡生长在良好的空气环境。做好鸡舍内通风换气工作，特别是冬季既要做好防寒保温，又要注意通风换气。用燃煤进行保温育雏时，切忌门窗长时间紧闭，以防止通风不良。加温炉必须有通向室外的排烟管，使用时检查排烟管是否连接紧密及是否畅通等。舍内温度预热到30~34℃，并检查能否恒温，以便及时调整。平时要在地面铺上干净的垫料，厚约3~5cm。

1.4控制好养鸡密度，改善土鸡的饲养环境。鸡舍内饲养密度不宜过大，以1~2周龄雏鸡30羽/m<sup>2</sup>、3~4周龄鸡25羽/m<sup>2</sup>、5~8周龄鸡12羽/m<sup>2</sup>、9~18周龄鸡8羽/m<sup>2</sup>、19周龄以后鸡6羽/m<sup>2</sup>为宜。笼养鸡舍内，鸡笼摆放不可过于拥挤、超标。

## 2制定科学的免疫程序，确保土鸡的健康养殖

2.1鸡新城疫：7~10日龄用I系疫苗滴鼻、点眼，同时皮下或肌肉注射油佐剂疫苗0.2ml;2月龄用I系疫苗免疫，5月龄用油佐剂疫苗免疫。或者，7~10日龄用I系疫苗滴鼻、点眼，1月龄后同上二免，3月龄用I系疫苗免疫，5月龄用油佐剂疫苗免疫。

2.2鸡马立克氏病：1日龄皮下或肌肉注射马立克疫苗0.2ml。对于种鸡群，推荐使用双价苗和细胞结合苗。

2.3传染性法氏囊病：10~14日龄用中等毒力疫苗饮水免疫(水中应含2%脱脂乳，下同);25~30日龄同上二免。对后备种鸡群，5月龄时注射油佐剂疫苗，10月龄时应再注射一次油佐剂疫苗，以保持子代有较高水平的母源抗体。

2.4传染性支气管炎：8~10日龄用H120疫苗首先滴鼻或点眼，3周龄时用H52饮水免疫，4月龄时用油苗注射。

2.5传染性喉气管炎：仅在发病鸡场使用活苗免疫。20~24日龄滴眼或饮水免疫，6周后重复免疫一次。

2.6禽流感：鸡20日龄和120日龄或快进入流感高发期、上次接种半年后，用0.5ml/羽肌注射接种一次。

2.7病毒性关节炎：14日龄接种弱毒疫苗，4月龄后注射油佐剂疫苗。

2.8鸡痘：3周龄刺种弱毒疫苗，4月龄后二次免疫。

2.9传染性脑脊髓炎：仅在疫场使用活苗免疫，10~12周龄用弱毒疫苗饮水免疫。

2.10传染性鼻炎：1月龄初免，注射油佐剂疫苗0.5ml;3月龄二免，注射1ml;6月龄三免(同前)。

2.11对土鸡寄生虫病的防治，以防治球虫病为主。在改善饲养环境、加强营养及饲养工具消毒的同时，可用磺胺二甲嘧啶，按0.1%~0.05%混入饮用水，连服2~4d;磺胺喹噁啉，按0.05%~0.1%混入饲料，饲喂2~3d，停3d;磺胺二甲氧嘧啶，按0.1%混入饮水，连用6d;磺胺氯吡嗪(三字球虫粉)，按0.03%混入饮用水;百球清(2.5%溶液)，按1L水中用药1ml量混入饮用水，自由饮用;也可用盐酸氨丙啉或地克珠利。