

一公分板栗苗供应、一公分板栗苗批发基地

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 一公分板栗苗供应、一公分板栗苗批发基地 |
| 公司名称 | 泰安高新区北集坡创隆园艺场 |
| 价格 | 2.00/棵 |
| 规格参数 | 品种:嫁接板栗树苗 高度:150 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省泰安市北集坡街道季家庄村 |
| 联系电话 | 18763831510 18763839889 |

产品详情

症状

该病危害芽、叶片、新梢和花穗。全年发病时期为4月至7月下旬左右。栗芽绽开时，病芽呈水渍状，后变褐枯死。幼叶发病，产生水渍状暗绿色病斑，以后整个小叶变黑褐色，枯死。叶片发病，产生水渍状小斑点，不久变成褐色，周围有黄绿色晕圈。叶脉发病，叶片呈扭曲状，*后叶片变褐，向内卷曲。叶柄也可受害。主脉和叶柄发病，往往蔓延到着生的新梢上。新梢发病时，往往引起花穗枯死、脱落，在新梢上留下疮痂状痕迹。

病原菌

病原菌为 *Pseudomonas castaneae*，属假单胞杆菌属细菌。病菌在叶片细胞间隙繁殖，使细胞解离、坏死。

发病规律

病菌在枝梢病组织中越冬，借助雨水传播。品种间发病有明显差别。

防治方法

剪除病梢，收集病叶，集中烧毁。栽培抗病品种。发芽前往树上喷洒1：1：160倍波尔多液。生长季节，于发病初期喷洒50%多菌灵可湿性粉剂600～800倍液或农用链霉素50～100ppm。

如何栽好板栗树？

一、选地。板栗树应选择在土层深、较肥、中性或微酸性、排水良好的土壤上栽植。山区栽植海拔高度一般不超过400米。*在阳坡栽植，否则结苞少、空苞率高。

二、整地、施肥。在平地、缓坡地成片栽植的，要全面挖翻整地(缓坡做成水平梯地)，然后挖成长、宽各0.8——1米、深0.5——0.6米的坑(穴)。每坑施腐熟有机肥50——100公斤、尿素0.5——0.6公斤、过磷酸钙0.4公斤，充分混合，施入坑内。对酸性较重的土壤，还要施少量石灰。有些土壤有效硼含量低于0.5ppm，因此，每穴还应施入硼肥10——15克做基肥，以防止板栗树因缺硼发生大量空苞，引起减产。

三、定植。一般平地亩栽40——50株，呈四方形。坡地亩栽60——70株，呈长方形。待树成年后，再进行间伐，或通过整枝，迫使树冠向上发展，以建成速生密植林，有利早期高产。在未成林前，可间作经济作物，实行以垦代抚。定植时间，以11——12月和2月中旬——4月上旬为宜。挖树苗时，要尽量避免损伤根系。远距离运苗时，根系沾上泥浆，用稻草包裹。起苗后要早栽，不能立即栽的先假植。树苗不能栽得过深，嫁接苗的愈合部位应露出地面，以防烂朽。

四、配植授粉树。板栗自花授粉率较低，故在选栽适合当地条件、优良高产的主要板栗品种时，须均匀混栽10%——15%与其花期略迟的另一品种，以利异花授粉，保证结果丰收。