

青脚麻小鸡苗批发 铁脚麻小鸡苗批发厂家 麻鸡苗鸡苗孵化场

产品名称	青脚麻小鸡苗批发 铁脚麻小鸡苗批发厂家 麻鸡苗鸡苗孵化场
公司名称	贵州伟静鸿禽业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.2 (kg) 贵阳:98%
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	17369032651 13547864653

产品详情

鸡传染性法氏囊炎(IBD)活疫苗是一种中等毒力的活疫苗，这种疫苗具有毒力强、对家禽的侵害程度大、安全性差等缺点，在临床免疫时常常诱发家禽发生多种不良反应，如呼吸道症状、肠炎、新城疫等，有的还直接引起家禽发生传染性法氏囊病。在基层，无论蛋鸡还是肉鸡饲养户，反映最多的就是鸡群免疫后易出现呼吸道症状，而且治疗起来很棘手。笔者就鸡传染性法氏囊炎活疫苗免疫后常引起的呼吸道病进行探讨。

目前几乎所有的养殖户都知道法氏囊疫苗免疫后应当及时预防家禽呼吸道疾病，泰乐菌素、红霉素、替米考星、泰妙菌素等各种抗呼吸道感染的药物都一拥而上。但是免疫后诱发的呼吸道病却依旧防不胜防，使用以上药物根本就没有疗效，这种情况在临床中让人难以解释。但是临床中有些时候发现免疫后鸡群有肠炎和呼吸道症状时，光使用肠炎类药物，却把肠炎和呼吸道病都治好了。

传染性法氏囊病毒是一种主要侵害禽类免疫器官法氏囊的病毒，而对家禽的肺、气囊侵袭较轻，所以，法氏囊疫苗引起的气喘、咳嗽等呼吸道症状不应该是传染性法氏囊病毒直接引起来的，而是其它原因引起的。鸡传染性法氏囊病毒感染鸡的主要途径是消化道，免疫后引起呼吸道症状的原因可能有三种，只有了解了发病原因，才能更好地去避免该病的发生。

第一，因为传染性法氏囊疫苗是一种中等毒力的疫苗，它对家禽的免疫力侵害较大，疫苗接种后可导致家禽法氏囊发生轻微病变，同时也可能导致家禽胸腺、脾脏、盲肠扁桃体等免疫器官或组织损伤，这就导致在短时间之内家禽免疫力下降，此时家禽很容易因吸入空气中的细菌、尘埃等引起呼吸道症状。而鸡舍内空气中的主要菌株是来自粪便的大肠杆菌

，所以导致家禽呼吸道的细菌主要是大肠杆菌，部分是由家禽感染霉形体引起的。这也是临床中使用广谱抗菌药或抗大肠杆菌药物能有效预防免疫引起的呼吸道病的主要原因。

用泰乐菌素、红霉素等抗呼吸道感染的药物治疗霉形体，以及部分革兰氏阳性菌疗效较好，而大肠杆菌和环境中的细菌对此类药物耐药性很高，所以临床使用该类药物预防法氏囊免疫后呼吸道症状难以达到理想效果；这时只要添加大肠杆菌方面的敏感药物(如氟苯尼考、头孢类、阿米卡星等)一般三天就可治愈，一般情况下，治愈大肠杆菌，霉形体感染也会很快消失。

第二，在实际生产中，人们都习惯在做疫苗时停药，无论抗菌药、抗病毒药统统要停掉，少则一天多则三天，致使细菌大量孳生加上机体抵抗力低下而发病，殊不知疫苗可都是“病毒”，与用抗菌药物完全不冲突的，即使疫苗停后马上用抗菌药也不会出现什么副作用。因此，在做疫苗时，抗病毒药要停止使用而抗菌药可以继续使用。

第三，不要忽视免疫亢进引起的呼吸道症状，如果在免疫后大肠杆菌药物也用了效果仍然不好，这时就要考虑是免疫亢进引起的，可在免疫24小时后用抗病毒药物，一般两天就可消除。

以上是我们常用的方法，但只是被动的应急方案。目前最根本、最有效的办法是改变免疫方法。随着科技的发展，研制新的疫苗、改变免疫方式才是根本办法。广东温氏公司重庆分公司在这方面已先行一步，2011年以来，他们采用1日龄在孵化场一次性使用专用疫苗免疫法氏囊。一年来，在重庆地区反应效果很好。这样就彻底解决了鸡传染性法氏囊炎活疫苗免疫后常引起的各种不良反(需要注意的是，此种免疫方法所用的疫苗为专用疫苗，大家切勿盲目模仿)。