

厂家直销土鸡苗 青脚土鸡苗批发 黑瑶土鸡苗 红瑶鸡苗价格

产品名称	厂家直销土鸡苗 青脚土鸡苗批发 黑瑶土鸡苗 红瑶鸡苗价格
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:2.8 (kg) 成都:98%
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

鸡球虫病是由艾美尔属球虫寄生于鸡肠上皮细胞引起的疾病。该病以出血性肠炎、血痢、雏鸡高发病率和死亡率为特征。寄生于鸡的球虫很多，致病力最强的为柔嫩艾美尔球虫以及毒害艾美尔球虫，前者引起急性盲肠球虫病，多见于幼鸡；后者引起急性小肠球虫病，多见于成年鸡，两者均可造成鸡群大批发病死亡。

一 流行特点

本病主要发生于3月龄以内的雏鸡，15~45日龄最易感染，且发病率和死亡率均很高。11日龄以内的雏鸡很少发生，成年鸡多为带虫者。本病一年四季均可发生，但在春夏多发。肉用仔鸡由于鸡舍内温暖且比较潮湿，发病的季节不如蛋鸡明显。感染途径主要是消化道。但拥挤、营养不良、卫生状况差、潮湿、育雏温度不平衡为发病诱因。

二 症状和剖检变化

病鸡怕冷而拥挤在一起，毛乱翅垂，闭眼打盹。常下痢，排出带血稀粪或血液。贫血，冠髯苍白，嗦囊内充满液体，后期运动失调，倒地痉挛死亡。3月龄以上的青年鸡多呈慢性经过。不一定出现血粪，但呈进行性消瘦、呆立、后期瘫痪、衰竭而死。

病死鸡黏膜及鸡冠苍白或发青，泄殖腔周围羽毛被液体排泄物污染。主要病变在盲肠，可见盲肠肿胀好几倍，呈棕红色或暗红色，质地比正常坚实，剪开可见血凝块、或是含有一种黄白色豆腐渣样、混有血液的坏死物。慢性病例，病变多在小肠前中段，尤以十二指肠显著肿大。肠壁发炎增厚，剪开后肠黏膜上有小出血区，内有黏性渗出物，常混有血块。

三 防治

对球虫的预防主要是加强饲养管理，保持舍内干燥，定期清粪，并按综合性防疫措施的要求进行各种消毒。为减少球虫感染，最好采用笼养或网上平养。抗球虫的药物种类很多，应根据具体情况选用。

氯苯胍。治疗量为每100千克饲料加入3克，预防量减半，连用5~7周。由于本品会使肉带有怪味，故肉用仔鸡上市前7~10天应停药。

球痢灵。治疗量为每100千克饲料中加入25克，连用3~5天，预防量减半，连续使用。

复方敌菌净。治疗量为每100千克饲料中加入20克混饲。

海南霉素。治疗量为每100千克饲料加入75克，混饲预防量为治疗量的2/3。

盐霉素。从10日龄之前开始，每100千克饲料中加入本品5~7克，混饲。7~10天为一疗程，间隔5天再用。

常山酮。治疗量为每100千克饲料中加入0.4克混饲，预防量减半，连用1~2周。