

黑龙江鸡苗批发市场 哈尔滨土鸡苗 鸡西快大麻黄鸡苗 大庆芦花鸡苗 K901鸡苗

产品名称	黑龙江鸡苗批发市场 哈尔滨土鸡苗 鸡西快大麻黄鸡苗 大庆芦花鸡苗 K901鸡苗
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.3 (kg) 成都:98%
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

鸡绦虫病是绦虫寄生于肠道内，引起鸡粪便稀薄、产蛋率下降、蛋壳颜色变浅、蛋重轻、畸形蛋增多的一种寄生虫病。本病一年四季均可发生，以6~11月份多发。绦虫病生活史较复杂，需要一个或两个中间宿主，主要是蚂蚁、甲克虫、苍蝇及一些软体动物为其传播宿主。一旦感染本病，蛋鸡生产性能会受到损害，给广大养殖户造成严重的经济损失。

一 发病情况

2014年7月3日，杏花村张某饲养的5 000只190日龄海兰褐蛋鸡，7天内产蛋率由95%下降到80%，蛋重偏轻，鸡蛋个体小，约有10%~15%鸡冠发白，倒冠。蛋壳颜色浅，变白(明显)约占10%~30%。采食量正常，饮水增加。用双黄连口服液和恩诺沙星治疗5天无效果。

二 临床症状

病鸡消瘦、不愿走动、呆立、羽毛松乱无光泽，病鸡排出的粪便中可见多少不等的白色、大米粒大小、长方形绦虫节片，成熟的节片中有虫卵。

三 病理变化

病鸡消瘦，十二指肠降部向下进入空肠10厘米左右可见虫体，小肠黏膜肥厚，盲肠扁桃体出血肿胀，其他脏器无明显变化。

四 治疗

用吡喹酮20毫克/千克体重拌料，集中1次投服。5天后再用1次。每吨饲料添加鱼肝油500克，连用7天。

槟榔煎剂饮水。槟榔煎剂的制法是用槟榔粉1克/千克体重(槟榔粉的用量不能太大，以免中毒)，加水煮成槟榔液，用纱布滤去药渣，冷却后待用，一般服完药后2小时内开始排虫，持续1~2小时排完。吡喹酮第二次驱虫后产蛋率开始恢复，20天后产蛋恢复正常。

五 笼养蛋鸡感染绦虫的原因分析

鸡通过吞食绦虫的中间宿主蚂蚁、苍蝇、甲虫、蛞蝓、螺狮等感染绦虫，接触不到这些中间宿主是不会感染绦虫的，由于鸡舍条件原因，笼养蛋鸡能接触到的主要是苍蝇，所以临床以赖利绦虫和漏斗带绦虫多发，由于接触不到蛞蝓和螺狮，所以不会感染戴文绦虫。

除了球虫，笼养蛋鸡主要感染的是鸡绦虫，因为在夏秋季节苍蝇大量繁殖，鸡通过啄食苍蝇感染绦虫。鸡线虫、鸡蛔虫是直接通过虫卵传播的，不需要中间宿主。笼养蛋鸡不接触地面，感染几率很低，所以笼养蛋鸡驱虫要以鸡绦虫为重点。

目前蛋鸡养鸡户的现实问题是散户普遍环境卫生差，生物安全对散户来说那只是概念，大多数做不到。蛋鸡户的规模并不像肉鸡户规模那么大，蛋鸡户目前非常散，夏季鸡舍苍蝇乱飞，绦虫感染也非常普遍。普通养鸡户鸡舍简陋，多数没有较多资金来投资鸡场硬件，根本谈不上能做到自动上料、自动刮粪。

六 体会

近几年来，绦虫病在蛋鸡生产中发病并不少见，由于对寄生虫病的防范意识较低和对生产性能的危害认识不足，容易忽视寄生虫感染的问题，临床中常造成误诊，延误了治疗时机，并造成一定的经济损失。部分养殖户不认识绦虫，直到用了驱虫药以后，看见被驱下的节片，才引起注意。另外很多养殖户习惯用伊维菌素作为广谱驱虫药物，然而实践证明这一类药物对绦虫无杀灭作用。

环境卫生差的鸡舍，鸡感染绦虫病后，肠道寄生部位呈针尖大结节样病变，中央凹陷。大量虫体聚集时，引起肠堵塞，可造成肠破裂和腹膜炎，鸡群出现死亡。此外，虫体的代谢产物