

乐山土鸡苗 四川青脚麻鸡苗 成都青脚麻鸡苗批发 眉山青脚麻鸡苗价格

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 乐山土鸡苗 四川青脚麻鸡苗 成都青脚麻鸡苗批发 眉山青脚麻鸡苗价格 |
| 公司名称 | 四川亿鑫和家禽育种有限责任公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品种:鸡苗 体重:4.3 (kg) 成都:98% |
| 公司地址 | 成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号 |
| 联系电话 | 17369032651 13320986593 |

产品详情

当冬季鸡舍温度低于20℃，或非常干燥时，因球虫卵囊孢子化不良，鸡球虫病的发生也随之减少；在高温和高湿的夏季，鸡球虫病的发病率较高，特别是在南方湿度大的梅雨季节前后为多发时期，此期，由于垫料较潮湿，球虫病会反复发作。

2 卫生、防疫

加强卫生消毒、合理防疫。小型鸡场和养鸡专业户由于鸡场条件差，技术力量薄弱，对球虫病不够重视，容易暴发球虫病。

3 间断光照

间断光照比连续光照感染球虫的危险性要高些，原因是前者会造成鸡积极翻动垫料而致感染机会增加，翻动垫料也改善了卵囊孢子化条件。

4 垫料

垫料的管理在控制球虫病上具有重要意义，垫料的管理不可忽视，其总的要求是：松、干、薄。

5 密度

高密度饲养是一种不良致病因素，当密度过大，鸡舍内空气较差，球虫病的发病率较高。高密度鸡群会造成卵囊密度增加，而致感染机会提高。

6饲养方式

饲养方式不同可引起对球虫病感染的显著差别，对网上饲养的鸡群而言，感染球虫病的机会是极低的。这主要是网上饲养的鸡不容易接近地面感染源的原因。

二 饲料因素

饲料中的各种抗营养因子，如单宁酸、植酸、棉酚和抗胰蛋白酶等，易与肠壁黏膜结合，导致肠壁的损伤，饲料中电解质平衡失调，使排泄的粪便湿度增加，都使球虫病的发生率提高；饲料中维生素A和维生素K缺乏，使消化道黏膜和血液凝固机制受损，容易遭受球虫病的侵袭；限制饲养时，鸡由于饥饿，啄食垫料，感染的机会增加，也会提高发病率。优质全价饲料能提高机体对球虫病的抵抗能力，蛋白质、维生素、无机盐等饲料组分在控制球虫病上具有重要意义，饲喂粗砂粒、颗粒饲料及粗纤维饲料也会降低球虫发病率。

三 应激因素

球虫病常在应激反应出现的几天后发生。这些应激反应包括营养失调、习性的改变、运输和气候变化等。剧烈的应激反应除有利于球虫病的发病外，还可促进球虫病的恶化。鸡群如受到马立克氏病感染，机体对球虫免疫会受到干扰而引发球虫病；感染了法氏囊炎病毒的鸡会使球虫病的症状加剧，可致盲肠出血提前，死亡率提高，黄曲霉毒素的存在会使球虫病死亡率提高40%。