

# 云南昆明乔化鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场

产品名称	云南昆明乔化鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

云南昆明乔化鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场乔化鲁丽苹果苗修剪分冬季修剪（休眠期修剪）和夏季修剪（生长期修剪）两类、冬季修剪的基本方法有短截、回缩和疏枝，有时把长放不剪也放在广义的修剪方法中。枝量过多，光照差，无用寄生枝多，果品质量差；枝量太少，产量难以提高，果子容易日烧短截又可分轻截、中截和重截等几种不同的程度，从而其修剪反应也不同。对枝条短截或长放，有利于缓和枝势、树势。对枝条中截、重截或回缩，有利于促进枝芽生长和枝组、骨干枝的更新复壮。疏枝可减少分枝，改善光照，并有抑前促后的作用，有利于花芽的形成。夏季修剪包括摘心、抹芽、疏梢、扭10梢、拿枝、拉枝、环剥等基本方法。传统的大树形、多主多侧、多级次，树体60%以上的营养用在生长新梢、枝干，只有少数营养用于结果，且冠内外矛盾较多，难以调控，不便管理，树冠内膛光照差，冠内冠外果实质量差异也大。果树管理是五级结构：主干-主枝-侧枝-结果枝组-结果枝。一般来说，夏季修剪对树体生长有一定的作用，能缓和枝势和树势，常有利于花芽的形成，在幼旺树上应用较多。乔化鲁丽苹果苗苹果幼树期的修剪以选留培养骨干枝为主，同时掌握轻剪多留辅养枝，增加枝叶量，使地上部和根系的生长早趋平衡，促进成花结果。苗木栽植后，按不同树形要求对苗木进行短截，称为定干。一般来讲，现在生产的杀虫、杀菌药大都是广谱性的，不建议混用。若要混用，要遵守以下原则。混合后发生化学反应致使植物出现药害的农药不能混用。如波尔多液与石硫合剂分别施用，能多种病害，但它们混合后很快就发生化学变化，产生黑褐色硫化铜沉淀，这不仅破坏了两种药剂原有的杀菌能力，而且产生的硫化铜会使植物发生严重药害。这两种农药混用会产生相反效果。喷过波尔多液的植物一般要隔3天左右才能喷石硫合剂，否则会产生药害。月中下旬，将袋囊用丝牢牢固定在枝上，袋口用丝封闭越冬。方法如果危害面积较小，可人工摘除袋囊深埋；幼虫危害期（7月上旬）喷2.5%溴氰菊酯乳油5-1倍液。草履蚧刺吸式害虫，一年发生1代。以卵在土中或枯枝叶上越冬和越夏；翌年1月下旬至2月上旬孵化群集上树刺吸危害。雄若虫4月下旬化蛹，5月上旬羽化，此时会看到树干或枝条上有白色袋囊，羽化后即与雌成虫，经后的雌成虫潜入土中（一般在距地表3厘米至6厘米深处）或在卷曲的枯叶内产卵，卵有白色蜡丝包裹成卵囊，每囊有卵1多粒。定干时剪口下要求有5~7个以上的饱满芽，20厘米~25厘米称为整形带。这些芽前发成技后，从中选留中心干的延长技及层主枝或较粗壮的侧生枝。每年冬季按整形要求剪截培养中心干和各级骨干枝枝头，注意剪口芽的质量和留芽方向。

这么庞大繁杂的结构级次就必然造成：成型时间长位于中心于层间和主枝下部的生长枝，除过密的需疏除外，其余枝条应适当多加保留，作为辅养枝，并采用轻剪长放拉平的方法，使其能辅养树体，缓和树势及早期结果。整形带以下定干当年不扶芽，有利于主干的加速和根系的生长，发出的枝条中近地面的和拥挤的可除，其余可控制或甩放。在培养骨干、利用辅养枝的同时，在主枝、副主枝的背后、两侧及背上应及时分别培养大、中、小各类枝组，使稳定结果。各个时期的目标不一样、树体特性不一样，采用的修剪方法也就不同，生产当中，许多人不分树龄都采用同一模式，显然是不合适的。过度的强调修剪作用，而忽略其他配套措施果树管理是一个综合管理，生产中有许多人过分强调修剪作用，而忽略了其他方面（比如肥水管理方面、花果管理方面、病虫害方面等）配合措施，出现了好多问题，其实修剪只是一个调节过程，主要是调节树势、调节光照和调节负载三方面的作用，如果说这三方面没有问题，果树则可以不剪，生产中许多人对修剪的作用认识模糊，稀里糊涂的剪，并不知道为啥要剪，出现问题在所难免。枝组在树冠内的配置做到上稀下密，内外稀中间密。初果期多培养两侧及背后的平斜枝组，盛果期后要适当多利用背上的直立枝组，以维持枝组的生长势。

许多果农舍不得取大枝，只剪小枝，造成果树骨架枝太多，只有没有兵采用自由纽锤形树形的植株，不必培养大型枝组。乔化鲁丽苹果苗夏季修剪是缓和幼旺树长势，促进花芽分化和早期丰产的一项重要措施，要充分加以应用。

旺长辅养枝在春梢停长后和秋梢开始生长时，可进行拿枝，使枝条的木质部伤而不断，从而改变角度、方向和生长势。低定干，基部枝位低，长势旺，而且若按要求开张角度，基部枝将贴近地面，这样结果不理想、背上枝更旺，且影响果园的其它生产管理工作旺长无花或少花的幼树还可采用春刻伤、夏环剥和秋拉枝的方法，促使成花。影响枝组配备的因素较多，如骨干枝数量、角度、位置等春刻伤是指春季萌芽前在辅养枝或侧生枝两侧及背后的芽上方进行刻伤，促使多萌芽；一般来讲，庭院里的植物品种不要太多，应以一二种植物作为主景植物，再选种一二种植物作为搭配。植物的选择要与整体庭院风格相配，植物的层次要清楚、形式简洁而美观。常绿植物比较适合北方地区。水在许多庭院里不可缺的精灵，它可以与庭院中的一切元素共同组成一幅美丽的水景图。而木材在家庭庭院中可以说是起着点睛的作用。户外家具，花槽、花架、秋千椅、围栏，无论用在庭院中的任何角落，它都会给人创造一种温馨、舒适、自然、和谐的氛围，满足人们对自然回归的迫切渴望。夏环剥是在5月下旬到6月上旬在主干上方或主枝、辅养枝的基部进行环剥或环割3~4圈，使在环剥口上万多积累养分，促进成花；秋拉枝是在秋梢停长前后拉大枝条的开张角度，有利于缓和枝势。

平面结果，无法完成树形自由纺锤形树形侧生枝的诱引也多在这一时期中进行。秋梢停长后20天左右，对辅养枝采用剪梢和回缩内膜枝组，也可减缓幼旺树的长势，并使小枝复壮。

乔化鲁丽苹果苗进入盛果期后，当逐步转入以枝组结果为主时，对多年生长的辅养枝要逐年清理、回缩和改造。一般情况下，4~5年才开始少量挂果，有的果园甚至5~8年才挂果特别是树冠郁闭的，要逐年落头开心和打开层间，使光透入内膛。为稳定结果防止大小年，有的修剪过轻，忽视了整形，无原则的轻剪缓放多留枝，过分追求单位面积枝叶量的增加，又造成枝量过大，主从不分，使树体结构紊乱而郁闭。夏管技术运用不当实践证明，夏剪技术运用得当，对早优质和维持良好的树形结构起着重要的作用。冬剪时要控制和保持一定的花芽和叶芽的比例达1:2~4。花芽过多之年，可采取疏芽、短截、回缩和破顶，并配合疏花疏果，不使结果过量，从而促进发枝。花芽较少之年，则尽量多保留花芽结果。

因此，开张角度一般也都不到位，基部枝生长过旺、过强对结果枝组要不断更新复壮，疏弱留壮，细致更新，保持结果能力。总之，通过修剪要使结果枝与营养枝之间保持一定的比例。

大体使每年结果枝的数量不超过总枝数的30%~40%。树形复杂，不易掌握当株间外围枝头开始交接，对延长枝原则上不再短截，可缩编放放，始终保持有一个生长势较强的带头枝。当树体渐趋衰老，外围新消生长量在30厘米以下时，生产当中还应该考虑果品生产目标等其他因素，确定合理的枝量要及时回缩骨干枝到2~4年生部位的分叉处，促进树冠较大的更新复壮。