

乐山土鸡苗 四川青脚麻鸡苗 成都青脚麻鸡苗批发 眉山青脚麻鸡苗价格

产品名称	乐山土鸡苗 四川青脚麻鸡苗 成都青脚麻鸡苗批发 眉山青脚麻鸡苗价格
公司名称	贵州伟静鸿禽业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 (kg) 贵阳:98%
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	17369032651 13547864653

产品详情

近年来，传染性腺胃炎已成为危害肉鸡生产最为常见的疾病之一，其主要临床症状为厌食、生长迟缓、体重均匀度较差、渗透性腹泻及排料便等。剖检特点为腺胃发炎、肿胀、壁变薄，以肌胃糜烂、溃疡及穿孔为主要特征。本病病程长，有的达20~50天，若有并发或继发其他疾病或各种应激都会加重病情。该病病原学复杂，真正病原尚未定论，本文对肉鸡腺胃炎病因进行分析，并提出防治措施，以期为广大养殖户提供参考。

一 病因分析

1 饲料因素

许多学者认为饲料源性胺、霉菌毒素、硫酸铜中毒、营养缺乏等致炎因子对该病的发生流行具有重要的促进作用。

2 病毒因素

由病毒引起的腺胃炎在国内外均有报道，其病原学非常复杂，因分离到的病原难以复制出临床典型病例，故真正病原尚未定论。

3 应激因素

密度过大、雏鸡早期育雏不良、雏鸡运输时间长、禁食、断水、脱水等均能诱发该病；另

外慢性呼吸道疾病频发的鸡群易于发生腺胃炎的感染；临床实验已经证明寒冷、炎热等致使鸡群采食量下降的应激因素会导致肌胃和腺胃病变(糜烂、溃疡和出血)；另外孵化应激也会导致1日龄雏鸡腺胃出血。

二 防治措施

1 预防措施

(1) 鸡苗选择

严格控制和检测种鸡群垂直传播的疾病，尤其是从国外引进的鸡种。种鸡群要净化鸡网状内皮增生症、传染性贫血等重要的垂直感染病原，选择无该病感染的种鸡场鸡苗。严格选用没有被这些病原污染的疫苗免疫种鸡和雏鸡。

(2) 健全生物安全措施

鸡场生物安全体系是一项系统化的管理，通过科学合理选择厂址、设立卫生消毒设施、构建科学有效的卫生消毒程序，减少外界疾病因素进入养鸡场或在养鸡场内部鸡群之间的传播，使鸡群远离致病因素。

(3) 加强饲养管理，减少应激因素

科学配置鸡的饲料，尽量避免使用劣质鱼粉及其他劣质蛋白饲料，保证粗蛋白、维生素E、维生素c供应，确保鸡群营养平衡；加强鸡的饲料管理，尽可能不使用潮湿的、发霉的饲料，并在饲料中添加脱霉剂；保证料槽、水槽卫生，避免使用发霉变质的垫料，减少杜绝应激因素，尽可能减少鸡传染性腺胃炎的诱因。

(4) 免疫接种

预防该病首先要做好免疫接种，减少传染病的发病诱因。1日龄皮下接种弱的活呼肠孤病毒可有效地产生主动免疫；10日龄左右接种鸡传支弱毒苗，以后12周龄及开产前各接种1次。

2 药物治疗

鉴于该病病原学复杂，发病后首先应做好该病的诊断。根据不同病例，综合分析发病因素，并采取消除病因、抗病毒、对症治疗、防止继发感染的综合治疗方案，才能从根本上防治传染性腺胃炎的发生。可考虑黄芪多糖+干扰素+头孢先锋霉素治疗；如果有霉菌感染，可以使用制霉菌素拌料；使用质子泵抑制剂奥美拉唑保护胃肠道，同时添加复合维生素B及添加3%葡萄糖以增加营养。在用药治疗的同时，应用聚维酮碘消毒，并在饲料中及时添加维生素、微量元素、蛋白质、矿物质等营养物质，增强鸡体的抵抗力。

三 结论

传染性腺胃炎是高密度集约化饲养的家禽场存在的问题，值得我们关注。饲料因素、病毒因素及应激等因素均会造成传染性腺胃炎的发生。对于传染性腺胃炎的病因要加以全面分析。生产人员与经理、临床兽医与营养专家之间开展团队合作是必不可少的。加强饲料检测、规范孵化场管理及做好禽病的综合防治是控制该病的关键。