

优质三黄鸡苗价格 三黄鸡苗批发价 快大黄鸡苗 黄花公鸡苗供应厂家

产品名称	优质三黄鸡苗价格 三黄鸡苗批发价 快大黄鸡苗 黄花公鸡苗供应厂家
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.2 (kg) 成都:98%
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

鸡群的免疫工作是养禽场生产工作的重中之重，免疫效果好坏决定生产的成败，以下简单介绍养禽场常用的免疫方法。

一 饮水免疫

饮水免疫是预防家禽传染病较常用的方法。具有方法简便实用，省时，省力，工作效率高且鸡群应激小等优点。在操作中应注意以下几点

1 选择合适的疫苗，注意疫苗质量

适于饮水免疫的疫苗一般是弱毒冻干疫苗，如ND 系、 系、传支H120和H52苗、传染性法氏囊病弱毒冻干疫苗等。疫苗应严格按照疫苗使用说明书操作要求使用。购买疫苗时，要检查瓶内是否真空，疫苗有无破损，看生产厂家，生产批号及有效期。使用疫苗前注意做好记录，并在使用记录上附上疫苗标签。

2 配制疫苗的浓度、剂量

饮水免疫要求每只鸡饮入有效剂量的疫苗。饮水量根据鸡的日龄和季节而定。如水量过少，一部分鸡会因喝水量大，水中疫苗浓度大而中毒，而另一部分则可能会因喝水量少，或没喝而达不到免疫目的。如水量过多，虽都能喝到水，但却不能在规定时间内喝完，使得水中疫苗浓度低和时间过长，因降低效价而达不到免疫预期效果，因此，要把握好饮水量，使得整个群体均能喝足水，且在1~2小时喝完。

每只鸡的一次最大饮水量：5~15日龄蛋鸡5~10mL / 只，肉鸡5~10mL / 只；16-30日龄蛋鸡10-20 / 只，肉鸡10~20mL / 只；31~60日龄蛋鸡20~30mL / 只，肉鸡20-40mE / 只；61~120日龄蛋鸡30~40mL / 只，肉鸡40~50mL / 只；120日龄以上蛋鸡40~45 mL / 只，肉鸡50~55mL / 只；

饮水量还要根据季节、气温等因素有所变化。为了达到免疫效果的均一性，可采用一天内两次连续使用，两次免疫所用的疫苗羽份相等。

3 饮水免疫前的停水、停料

在饮水免疫前根据舍温、季节决定停水时间，一般情况下16~25℃时停水3~4小时，25℃以上时停水1~3小时。春季停水4~5小时，炎热夏季停水2~3小时，冬季停水5~7小时。若停水时间过长易造成体质好的鸡只过量摄入疫苗，停水时间过短鸡只饮不完水，剩余的疫苗病毒被灭活，饮水疫苗量不足，造成免疫失败。而且，饮水免疫前必须控料，免疫后至少2~3小时才能喂料。对于产蛋期来说，可以在前1天下午或晚上开始停水，第2天早上免疫后2小时再开始喂料。

二 气雾免疫

气雾免疫，省工省力，且对呼吸道有亲嗜性的疫苗特别有效(例如鸡新城疫IV系弱毒疫苗和传染性支气管炎弱毒疫苗等)，由于气雾免疫不仅可刺激粘膜产生分泌型的IgA等，形成局部免疫力，又可引起全身性的免疫应答，形成体内广泛而有效的免疫保护作用，因此，气雾免疫法是一种值得稳步推广的免疫方法。

1 注意免疫鸡群的日龄

日龄过小的鸡做气雾免疫，易引起呼吸道症状，影响免疫效果。生产中常常在大于45日龄的鸡做气雾免疫。

2 使用合适的佐剂

稀释疫苗最好使用去离子水、蒸馏水、凉白开水、清洁用水，切不可用生理盐水。为保护疫苗，稀释时应加入0.1%的脱脂奶粉、3%~5%的中性甘油、1%明胶、10%葡萄糖、10%蔗糖等佐剂。冬天气雾免疫时，水温在20~30℃之间再稀释疫苗，从而避免雾滴过冷引起的应激。