

大种黑芦花鸡苗 快大型芦花鸡苗批发 芦花鸡苗孵化场厂家

产品名称	大种黑芦花鸡苗 快大型芦花鸡苗批发 芦花鸡苗孵化场厂家
公司名称	贵州伟静鸿禽业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 (kg) 贵阳:98%
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	17369032651 13547864653

产品详情

(1)鸡群于12、13日龄饮水，加2倍量干扰素。12~18日龄拌料大巴道(牧益堂)，于14-16日龄信必妥200只/瓶饮水，17、18日龄新城疫反义核苷酸饮水2倍量(施克林)，大群投服活力健+氨基维他。抗生素投服肠杆菌必治、立康。

鸡场采取隔离消毒措施：场区用5%火碱、白灰消毒，死鸡每天拉1千米外深埋处理。严格挑选病鸡蔫鸡，每天淘汰1.5%-2%。50 温水每天2次安灭杀、碘制剂交替带鸡消毒。

(3)15~18日龄发病高峰每天死淘4%~5%，24日龄时每天死淘0.6%左右，26日龄呼吸道症状加重，30日龄因细菌混合感染严重，经肝脏涂抹、琼脂培养、药敏试验证明阿米卡星高敏，故31、32日龄晚注射阿米卡星+阿奇霉素+利巴韦林+安痛定，35日龄趋于正常，38日龄用人用溴乙新辅助治疗呼吸道症状效果明显。整个过程采食量都稳步上升。

(4)30日龄抽取12只血清样送化验室做HI抗体检测，10只正常测出，其中6只滴度为7~9,4只5~6个滴度，证实鸡群感染新城疫。

三讨论

(1)病毒性疾病的预防，仍应以鸡场生物安全为主。发生感染后发现越早，诊断和处置就越及时快速，养殖户的损失就会越小。

(2)干扰素的使用时效：鸡群发生病毒性疾病的3天内，饮水或者肌肉注射效果最好。否则，3天以上、或者干扰素本身质量不可靠，效果都不会理想。

(3)此病的发病过程，一般在发病后第3~6天是死亡高峰，凭此可以帮助预估后续的状况，若是大群精神状况明显不好，及时全群淘汰处理；若是大群较好，采食还行，就及时淘汰病鸡，做好带鸡消毒，选用较稳妥治疗方案。发病7天以上，后续出现扭脖现象，死淘会逐步下降，同时再考虑大肠杆菌等细菌性的

继发感染进行治疗或预防。

(4)新城疫预防早期主要是靠鸡雏母源抗体，后期的预防主要是依靠早期做的油苗和8日龄、21日龄的灭活苗免疫来提供体液、粘膜免疫。若是20日龄时有明显呼吸道症状，慎重做防疫，可以连续投服两天信必妥等药物来提高鸡群免疫力。在疾病多发季节，30日龄再做两次投服。坚持做好场区周边消毒以及舍内带鸡消毒。下批鸡入雏前场区严格消毒，舍内使用甲醛+高锰酸钾熏蒸。将鸡粪、死鸡处理干净，并加长空舍时间。