

红枫种植 淘氧彩叶苗木合作社 大兴安岭地区红枫

产品名称	红枫种植 淘氧彩叶苗木合作社 大兴安岭地区红枫
公司名称	句容市茅山淘氧彩叶苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇暮东水库西南岸
联系电话	13905299355

产品详情

为了提高发芽率和出苗率，需对种子进行处理，常采用以下一种或几种方法。

选种浸种：将干藏种子浸水2~3d，除去30%~50%的上浮瘪粒，取出沉下的种子，红枫哪家好，晾干备用。这样既可以让种子吸足水分，提高种子发芽率和发芽势，还可以减少带病菌的涩粒或易在土中霉烂的瘪粒。

催芽:在温水浸种4d后把种子放在4~8 的条件下10d。 **低温层积处理：**冬季在室内用1层湿沙铺1层种子层积，并保持沙子润湿。低温层积时间至少在30d以上，超过60d，这样即使在10~30 的条件下也能播种。

榉树是国家二级保护树种，种质资源日趋枯竭，大规格苗木目前处于散生状态。榉木是名贵的木材，接近红木的价格，市场价值很高。榉树在园林绿化上是作为彩色树种配置的。其重要的特征是木质暗红，秋季叶色变红。 俗称的红榉其实才是真正的榉树。榔榆的俗名为白榉；朴树的俗名为青榉。

榉树和朴树（青榉）的区别:榉树叶明显带齿，手摸感觉粗糙，秋季叶色变红，朴树叶不带或者带的齿不明显，手摸光滑，秋季叶色不变，榉树皮发灰白色，朴树皮是深灰色。

榉树和榔榆（白榉）的区别:两者叶片接近.但榉树脱的皮厚，大兴安岭地区红枫，榆树脱的皮很薄

穴、沟准备。定植穴深60~70厘米，红枫种植，直径60~70厘米，栽植穴的大小也要根据土质好坏来决定，土质好的挖，土质不好的要挖大穴，表土和心土要分开放置，供应红枫，表土和腐熟好的土粪掺匀后填入树穴下层，新土放在表层。根区和施肥区间隔20厘米，严禁施鲜粪作底肥，以免伤根。

苗木栽植。栽植时间落叶果树一般以冬季为宜，常绿果树以春季为宜，定植时要做到规格化，达到横竖成行。定植时嫁接口应露在地面，根系要伸展，然后培土、踏实、水渗后再封穴，以利保水。

苗木定干。果树苗木栽植后要及时定干，多风地段宜矮化栽培，桃、油桃、李、一般采用开心形，

应于20~40厘米处于定干，剪口下10厘米带内要留饱满芽选留作主枝用，葡萄留1~2芽。

红枫种植-淘氧彩叶苗木合作社-大兴安岭地区红枫由句容市茅山镇春城湖生态农庄提供。行路致远，砥砺前行。句容市茅山镇春城湖生态农庄致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!