

佳红樱桃树苗上车价格、佳红樱桃树苗今年价格

产品名称	佳红樱桃树苗上车价格、佳红樱桃树苗今年价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	品种:一公分樱桃苗 高度:150 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

苹小卷叶蛾又称小黄卷叶蛾、苹卷蛾、棉卷蛾、舔皮虫。近几年在樱桃产区发生日趋严重，成为樱桃生产主要防治对象。本文深入分析介绍了樱桃苹小卷叶蛾的危害特点、形态特征、发生规律及防治措施，供大家参考。

1、危害特点

低龄幼虫取食嫩叶嫩芽，被害重者芽枯死，轻者残缺不全，影响开花、展叶和坐果。稍大后多卷叶、平叠叶片形成虫苞，在内取食叶肉，啃噬叶片成网状。坐果后，可将叶片缀贴在果面，啃食果皮果肉，被害部呈不规则凹疤，降低果实商品价值。

2、形态特征

苹小卷叶蛾成虫体长6~8mm，翅展15~20mm，体黄褐色。卵椭圆形，稍扁，直径约0.7mm，初为淡黄色，孵化前深灰色，常数十粒鱼鳞状排列成块。幼虫体长13~18mm，细长，浅绿或翠绿色，头小，淡黄绿色。蛹长9~10mm，开始绿色，后变为黄褐色。

3、发生规律

苹小卷叶蛾一般每年发生3~4代。以低龄幼虫在树皮缝、剪锯口等处结白色小茧越冬。翌年4月中下旬樱桃发芽时，越冬幼虫开始出蛰，危害幼芽、嫩叶和幼果。5月上中旬出现越冬代成虫，6月上中旬为一代幼虫发生盛期，危害也为全年最重期。成虫有趋光性和趋化性，常昼伏夜出。羽化后2~3天产卵，多产在叶面，卵期6~10天。幼虫活泼，震动卷叶时随之钻出吐丝下垂脱逃，虫期18~26天。幼虫老熟后在卷叶内或叶果缀连处化蛹，蛹期6~9天。该虫有多次转移危害习性，当虫苞受害严重食料不足时，便转移到新的嫩梢嫩叶重新卷叶危害。冬天气候温暖、翌年气温回升快，春季雨水多，湿度大有利于该虫的发生。

4、防治措施

4.1 搞好冬春清园，消灭越冬虫源

在樱桃休眠期，结合冬剪和春季管理，彻底剪除树上的干橛、刮除树体粗老翘皮、清除田间残枝落叶，集中烧毁。越冬幼虫出蛰前，用杀虫剂涂抹剪锯口、枝杈等处进行早期防治。

4.2 摘除卷叶虫苞，减轻幼虫危害

现代樱桃管理多采取周年修剪技术，而且该虫危害所形成的虫苞、卷叶目标明显，容易识别和发现。在各代幼虫发生期，可结合春夏季节拉枝、修剪、摘心、扭梢等操作，随时摘除虫苞和卷叶，即可有效地减轻幼虫危害，保证树体正常生长，同时还可大大减少防治用药，节省成本，保证产品质量安全。

4.3 突出关键时期，搞好药剂防治

搞好药剂防治。一是掌握好用药时间。提倡治早，突出早防，将传统的幼虫期防治调整为卵盛期或卵孵化盛期用药，最好在幼虫卷叶危害之前。最佳防治时期为4月中下旬出蛰盛期和5月下旬至6月上旬第一代卵盛期或卵孵化盛期。二是两次用药，防前治后。由于受小气候和立地环境影响，虫害发生有早有晚，虫态不齐，一次用药很难奏效。所以，每个关键防治时期最好用药2次，第一次用药后5~7天再喷一次。三是选择高效低毒，符合食品质量安全，兼有触杀、胃毒作用，残效期相对较短的无公害药剂。常用的药剂有：1%苦参碱鳞螨蚧多杀1000~1200倍、1%苦参碱虫螨全杀2000~2500倍、24%甲氧虫酰肼

4000 ~ 5000倍、48%毒死蜱1200 ~ 1500倍、2.5%菜喜1000 ~ 1500倍、5%美除1000 ~ 2000倍液等。为延缓抗药性产生，药剂应交替使用。四是注意喷药质量。喷药保证喷匀喷透、药液全面覆盖。同时，在药液中适当添加其他助剂，以增强药液的展布性和渗透性。