

## 新梨七号梨树苗品种介绍、新梨七号梨树苗上车价格

产品名称	新梨七号梨树苗品种介绍、新梨七号梨树苗上车价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接梨树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

### 产品详情

生长结果习性 树势健壮，树姿开张。新梢粗壮，尖削度大，平均长度55 cm。萌芽率高，达83.8%，成枝力中等，以短果枝结果为主，占71.8%。多年生枝较长把梨更易形成鸡爪状短果枝群，新梢甩放后易形成叶丛状短果枝，早果性、丰产性强。干周30 cm的盛果期实生树冠径为2.6 m × 2.1 m。高接后第3年，单株产量39.7 kg，折合亩产2 223.6 kg。综合性状极为优良。

2.4 物候期 在烟台地区叶芽萌动期在3月中旬，展叶期在4月中旬，春梢停长期在6月下旬，落叶期在11月上旬。花芽萌动期在3月下旬，盛花期在4月中下旬，果实9月上中旬成熟，果实生长发育期130天左右。

2.5 抗性及适应性 对土壤和气候条件要求不严格，耐旱，适应性广，山地、河滩地及平地均可栽植。抗病性强，抗白粉病、黑斑病，虫害较轻。

### 3 栽培要点

3.1 选址建园 建园要求选用壮苗，株行距以 3 m × 4 m 为宜，亩栽56株，定干高度80 cm，南北行。土质以壤土、沙壤土为宜。栽植时应配植授粉树，品种宜选用黄金、绿宝石、二十世纪等。主栽品种与授粉品种比例为8 1或5 1。

3.2 整形修剪 树形宜采用多主枝自然开心形或纺锤形。定植第1年定干后往往只发出1~2个枝条，应摘心促发分枝，摘心时间一般在5月下旬至6月上旬;秋季木质化前拉枝开角，当年冬剪疏除竞争枝、徒长枝、背上枝、交叉枝等;主干适当短截，其余枝尽量轻截或不截，增加枝叶量。幼龄树成枝力强，应少截、多疏。培养结果枝应采取先放后缩的办法，以促使形成大量短果枝群。

3.3 土肥水管理 栽后第1年每次株施磷酸二铵40~60 g，加10%稀粪水5~10 kg，第2、3年每次株施氮、磷、钾复合肥150~200 g，4~5年生树每次株施氮、磷、钾复合肥300~500 g，同时结合病虫害防治，每15天左右对树冠喷1次0.3%尿素+0.2%磷酸二氢钾。结果树每年提倡施3~4次肥，重点要施好基肥和壮果肥。

3.4 病虫害防控 主要防治蚜虫、梨木虱、梨小食心虫、梨茎蜂、腐烂病、黑星病、轮纹病等病虫。采收后及休眠期刮除老翘皮、病斑;刮除腐烂病、干腐病病疤，刮后涂843康复剂。发芽前10~15天，喷苯醚丙环唑或戊唑醇或氟硅唑3 000倍液+毒死蜱800倍液+拟除虫菊酯800倍液清园;花后5~7天，喷苯醚甲环唑3 000倍液或多抗霉素800倍液或甲基硫菌灵800倍液+丙森锌或代森锰锌800倍液+噻虫高氯氟或阿维菌素或甲维盐或功夫菊酯+杀螨剂;谢花后15~17天，喷药后套袋，注意交替用药，以防产生抗性;谢花后30天左右，喷苯醚丙环唑或戊唑醇或氟硅唑5 000倍液+毒死蜱1 500倍液+拟除虫菊酯2 000倍液。

#### 4 选育小结

玉晶梨果实近圆形，果个大，光洁无锈，外形美观;果肉白色，肉质细腻，石细胞少，汁液多，风味酸甜，品质上等，继承了大果水晶梨果个大、肉质细、石细胞少、风味甜的优点和长把梨耐贮藏的优点，是一个优良的中晚熟梨品种。

#### 套袋梨

果小低产原因。 树势衰弱。陕西蒲城上世纪80年代引进的酥梨主要分布在县城南部的陈庄、党木、贾曲，以及县城东部的东阳、春林、平路庙，立地条件差，土壤有机质含量低，灌溉条件不好，如今树龄已高达20~25年，树形多为倒“人”字形，普遍生长较弱。 光照条件差。蒲城地区梨园普遍存在留枝量过大，营养枝、结果枝、直立枝交叉生长问题，尽管经过几年简化修剪，但枝量过大仍造成树冠密闭，树体通风透光条件差，加上套袋后果园风光条件进一步恶化，不仅管理困难，而且树冠下部病虫害多发，严重影响套袋梨质量。 管理粗放。生产管理前紧后松、套袋技术不规范等对产量品质均有不同程度影响。

2)套袋梨大果优果措施。 增强树势。应针对蒲城梨区老果园土壤板结问题，积极采取深翻改土措施，增施全营养生物有机肥，改良土壤理化性状，增强土壤保水保肥能力，尽快恢复树势。 合理修剪。改善树体结果布局，做到以树定产，以肥定产。修剪时加大对不合理结果枝的改造力度，疏除内膛弱枝和过多过密的骨干枝，优化梨园树体结构，改善通风透光条件。 合理负载，购买优质果袋，规范套袋技术。