

库尔勒香梨树苗包邮价格、 库尔勒香梨树苗苗圃价格

产品名称	库尔勒香梨树苗包邮价格、 库尔勒香梨树苗苗圃价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接梨树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

花果管理。疏花：由于高接后的梨成花容易，花量大，每年应进行疏花。花序分离时，每15~20厘米留一花序，每一花序留2~3朵边花，其余花全部疏掉。落花两周后开始疏果，幼壮树按30叶留一果，每一花序留一个果实。

人工授粉：选择花粉量大的品种做授粉树，大梨树留1~2个边花，花过多要进行疏花序。一般每25公斤鲜花可采花药2.5公斤、干花粉0.5公斤，可供20~30亩盛果期树授粉用。

刚采下的鲜花要及时在室内将花蕾倒入细铁丝筛中，用手轻轻揉搓(花药一搓即掉)。然后将搓下的花药去掉杂质后烘干制粉。将花药摊晾在干燥、通风、温暖而又洁净的室内白纸光面上，温度保持22~25℃。1~2天花药即裂开散粉，然后将花粉过细筛，去除杂物。制粉后，将花粉装在暗色瓶内，密封后放在冰箱内备用。用人工点授或液体喷粉等方法进行授粉。套袋。疏果后在5月10~15日套小袋防霉心病，6月10~15日套大袋。所有果实都套袋，套袋前要浇一次水、喷一次杀虫、杀菌剂。套袋顺序为先上后下、先里后外。

5.病虫害防治。高接园全年以防治梨黑星病、梨木虱和黄粉芽等病虫害为主。主要措施如下：

梨黑星病：落叶后至发芽前彻底清扫落叶;4月下旬至5月底彻底摘除病梢(乌码);从5月初开始进行药剂防治，常用药剂有：12.5%腈菊唑乳油3000倍液、12.5%烯唑醇2000倍液、4%福星乳油8000~10000倍液或80

%大生M-45 800 ~ 1000倍液等。

梨木虱：休眠期彻底清扫落叶，降低越冬基数;早春成虫出蛰前(3月上、中旬)喷施4.5%高效氯氰菊酯乳油2000倍液防治;梨树落花后(4月20日左右)和一代成虫发生前(5月初)是两个用药关键期，可使用2.5%高渗吡虫啉乳油3000倍液、1.8%爱福丁6000 ~ 8000倍液或0.3%敌虱螨3000倍液等生物源农药防治。

梨黄粉虫(蚜)：抓紧套袋前和套袋初期的药剂防治，可使用吡虫啉类药剂针对枝干和袋口仔细喷雾，防止黄粉虫入袋。

晚栽。先将准备好的苗木放置于窖中或阴凉避光处，待气温升高，周边果园梨芽萌动时开始栽植，以提高成活率，保证苗木生长量和整齐度。

3) 覆膜。苗木定植后，园地覆盖黑色地膜，保湿、提高地温，加速根系生长发育。

4) 套干。苗木定植后，树干上套塑料薄膜袋，减少树体水分蒸发，加速梨芽发育。

3.2 整形修剪

1) 选择树形。圆柱形，树高3 ~ 4 m，保持强壮的中心干，中心干上着生24 ~ 26个结果枝组，枝组基角70° ~ 90°。

2) 不定干或高定干。梨树品种大多数顶芽饱满，发育快，对个别顶芽发育不良的苗木可高定干，使苗木高度保持在1.5 m以上。

3) 刻芽促分枝。苗木定植后第2年萌芽前，对地上80 cm以上、树顶30 cm以下区间的梨芽全部刻芽，促发分枝。用钢锯条在芽上部0.5 ~ 1 cm处横刻干周一半，深达木质部。

3.3 果园生草改清耕管理为生草覆盖，在行间种植苜蓿等绿肥作物，5月刈割覆盖，6月末连同有机肥一并用旋耕机翻入地下。也可在果园杂草长到25 cm左右时，用机械割草覆盖于行内或行间。

3.4壁蜂授粉花期用角额壁蜂授粉，提高坐果率和果实品质。

3.5平衡营养对个别发育不良的梨树可进行叶片养分分析，有针对性地配制营养液，采用打吊针的方式输入树体。

4注意事项

1) 栽植时要采用长方形布局，宽行密株，行距要比株距大2 m以上，以便于机械化作业。

2) 采取圆柱形瘦身树形，树体结构由原来的主干、主枝、侧枝、大型结果枝组、中型结果枝组、小型结果枝6级减少为主干和结果枝组2级，减少了营养物质在枝干上的消耗，有利于果实生长发育。宽行也可极大地改善果园通风透光条件，减少病虫害发生，提高叶片光合效能，同时方便修剪、套袋等作业，提高劳动效率，降低劳动强度。

3) 采用覆盖制的果园，当果园杂草或绿肥作物长到25 cm左右时，刈割覆盖于果