

## 优瑞卡蓝莓苗批发基地、优瑞卡蓝莓苗上车价格

产品名称	优瑞卡蓝莓苗批发基地、优瑞卡蓝莓苗上车价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	基地:山东蓝莓苗基地 高度:50 苗级:一级苗
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

### 产品详情

蓝莓这种果实营养非常高，而且医疗价值和保健功能非常高，在人们的生活中很受欢迎。而且近年来，蓝莓苗木的栽培面积也逐渐增大，问题出现了。蓝莓苗木什么时候栽培比较合适？今天的编辑介绍给大家。1、蓝莓的栽培时间为4~7月。其中温室栽培于4月，冷室5月，普通田6月，晚熟品种等于7月。其成熟期比较短，一般季度成熟，通常在5-10月发售，7月产量高。未成熟时为白色，成熟后为蓝色。2、一般选择每年春天种植，这个时期的蓝莓苗木容易运输、管理、定植。北方地区一般在春季栽培，秋季栽培冬季管理不当容易冻害，春季栽培通常在3~4月，一般选择2~3年的苗，苗便宜，二是适应性强，容易栽培。3、在定植蓝莓之前，必须确定必要的蓝莓苗木品种和相应的数量，在6~12个月前预准备后立即栽培。在实

际生产中，可根据

具体的栽培品种、植物大小、土壤肥力和管理水平调整栽培密度。

蓝莓苗灰霉病主要发生于定植初期的扣小拱棚期间。由于低温、寡照、湿度大，该病易发生，并危害严重。症状为植株各部位有灰色霉状物，严重者整株死亡。喷药防治，异菌脲类药物效果较佳，如扑菌灵1000倍、倍保1200~1500倍、扑海因1000—1500倍，7—10 d喷1次，连续二三次。蓝莓苗根(茎)腐病发生于定植初期，危害根或近基质茎部，严重的引起死亡。防治上首先将基质消毒，控制基质湿度，使之相对稳定；及时喷施恶霉灵3000—4000倍液、多效灵1500倍液等。蓝莓苗枝条枯萎病主要发生于中前期，新梢(枝)顶端坏死，沿茎向下侵染，至整株枯死。可定期喷保护药剂如甲托1500倍液、倍保1000~1500倍液、多菌灵1500倍液等。蓝莓苗蚜虫主要危害新梢，易传播病毒

病，一旦发生须及时防治，如喷吡虫啉1500-2000倍液，蚜虱净2000倍液，阿维菌素2000~3000倍液等。