

地栽绿宝石蓝莓苗品种介绍、地栽绿宝石蓝莓苗批发价格

产品名称	地栽绿宝石蓝莓苗品种介绍、地栽绿宝石蓝莓苗批发价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	基地:山东蓝莓苗基地 高度:50 苗级:一级苗
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

一、蓝莓僵果病症状及危害

蓝莓感染僵果病后，新叶、芽、茎干、花序等的突然萎蔫、变褐色，在3~4周后，僵果病真菌孢子会覆盖叶片叶脉、茎尖、花柱，并向开放花朵传播，最终会侵害到果实，表现为果实萎蔫、失水、变干、脱落、呈僵尸状，因此称之为僵果病。

僵果病主要为害生长的幼嫩枝条和果实，导致幼嫩枝条死亡，进而影响蓝莓产量。感病的花变成灰白色，类似霜冻症状。感病叶芽从中心开始变黑，枯萎死亡。病菌侵染3周后，在茎和叶片上出现大量灰褐色孢子。在蓝莓果实形成初期，受害果实外观无异常，切开果实后可见白色海绵状病菌。随着果实的成熟，与正常果实绿色蜡质的表面相比，被侵染的果实呈浅红色或黄褐色表皮软化。

二、蓝莓僵果病传播途径和发病原因

1、蓝莓僵果病每年侵染蓝莓2次，第一次以越冬子囊盘中释放的子囊孢子侵染幼嫩枝条。子囊盘的开放与蓝莓枝条春天萌发的时间相同。第二次以分生孢子侵染。在侵染初期，成熟的孢子在新叶和花的表面萌发，菌丝在叶片和花表面的细胞内和细胞外发育，引起细胞破裂死亡。

2、蓝莓僵果病的发生与气候及品种相关。早春多雨和空气温度高的地区往往发病严重，冬季低温长的地区发病严重。

僵果病病菌在前一年落地的僵果上越冬，在第二年春季萌发，再次进入第二年循环侵害。

三、蓝莓僵果病防治方法

- 1、选用抗病蓝莓品种，如高丛蓝莓中的奈尔森、蓝塔、达柔、考林则抗病性强，蓝丰、伯克利、蓝乐、早蓝、泽西、维口则易感病。
- 2、在入冬前，清除果园内落叶、落果，烧毁或埋入地下，可有效降低僵果病的发生。
- 3、在早春及开花前喷施20%的噻胺灵进行预防病害发生。