

脆红李子树苗便宜价格、脆红李子树苗品种介绍

产品名称	脆红李子树苗便宜价格、脆红李子树苗品种介绍
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接李子树苗 规格:一公分 高度:150
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

冬季果园使用涂白剂已成为管理中的重要一环。果树涂白以后其作用主要是对树体起到一定的保护作用，涂白既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害，起到防冻的作用，而且也可消灭在果树皮层缝隙中越冬的病虫害，并能杀死在树干基部危害的害虫。防止天牛、介壳虫等害虫在树干上产卵或附着，同时还可以遮盖伤口，抑制病菌菌体和进一步侵染，减少干部病害的发生，在防治果树病虫害中的作用，已引起越来越多的果农的重视。

涂白因其作用不同，配方也不尽相同，其原理更是有所差异。但是无论是哪种配方，其主要成分都可以归结为三类。即石灰、杀菌剂成分和辅助剂，其成分上的主要差异一般是这三种原料所占的比例不同而已，从而起到的作用和效果也不尽相同。

一是石灰。石灰使果树涂白后呈现白色，白色具有反光作用，不仅能减少植株对太阳热能的吸收，缩小昼夜温差，起到保护皮层，防止日灼、冻害的作用；而且还能防止天牛、吉丁虫、大青叶蝉等害虫枝干上产卵危害。石灰的质量直接关系着涂白剂的质量。石灰质量不好，配制出的涂白剂维持的时间短且不能起到应有的效果。

二是杀菌杀虫成分。涂白剂的杀菌成分，一般为硫磺、硫酸铜、石硫合剂等。其主要作用物质同石硫合剂一样都是有活性的硫元素。涂白剂本身具有防治病虫害的作用，一般不需要加入其他防治病虫害的药物。但这些年的实践表明，为加强对病虫害的防治作用，涂白剂中可以额外掺入适量杀菌剂或杀虫剂。如为了防止在树下匿藏习性的叶部害虫，可在涂白剂中适量掺入拟除虫菊酯农药（速灭杀丁、敌杀死等），但要注意随配随用。如果果树树干已有溃疡病、腐烂病，可先采用刮除病斑、消毒等辅助措施，再涂白保护，涂白剂中可以适量加入多菌灵、甲基托布津等杀菌剂。需要注意的是涂白剂呈碱性，不能和对碱

不稳定的农药混用，也不能和波尔多液混用。对已经受到病菌侵染的果树，除了在冬季正常进行涂白外，还应加强管理，冬季注意防寒防冻，夏季注意防日灼，尽量避免机械损伤。在早春萌动前喷施石硫合剂，杀死越冬病菌。发病期喷施相应的杀菌剂进行防治。

三是辅助剂。目前，在配制涂白剂时，普遍使用的辅助剂为食盐、动物油、豆粉或洗衣粉等。

几种常用涂白剂配方

1.硫酸铜石灰涂白剂。硫酸铜10千克、生石灰200千克、水600~800千克（或以硫酸铜、生石灰、水以1 20 60~80的比例配制）。调制方法：用少量开水将硫酸铜充分溶解，再加2/3的水加以稀释；将生石灰和剩余1/3水慢慢熟化，调成浓石灰乳；当以上两种液充分溶解且温度相同后，将硫酸铜倒入浓石灰乳中，并不断搅拌均匀即成涂白剂。

2.石灰硫黄涂白剂。生石灰10千克、硫黄1千克、食盐0.2千克、动物油0.2千克、热水40千克。要求生石灰色白、质轻、无杂质，如采用不纯熟石灰作原料，要先用少量水泡数小时，使其变成膏状无颗粒。硫黄粉越细越好，最好再加一些中性洗衣粉，约占水重的0.1%~0.3%。用40 ~50 的热水将硫黄粉和食盐分别化开，在硫黄粉溶液中加入洗衣粉；将石灰乳和硫黄粉溶液充分混合，加入食盐和油脂充分搅匀即成。

3.石硫合剂生石灰涂白剂。石硫合剂原液0.5千克、食盐0.5千克、生石灰3千克、油脂适量、水10千克。调制方法：将生石灰加水熟化，加入油脂，搅拌后加水制成石灰乳，再倒入石硫合剂原液和盐水，充分搅拌即成。

4.石灰黄泥涂白剂。熟石灰100公斤、黄泥120公斤。调制方法：将熟石灰、黄泥加水，混合后搅拌成浆液状即可使用，可酌情加入杀虫剂，以兼治在林（果）木上越冬的枝干病虫害。

几种常用消毒剂配方

果园在冬剪后，均会在果树上形成伤口，若不及时保护治疗，容易造成病原菌极易从伤口侵入树体，引起伤口感染，造成溃疡或腐烂，导致果树抗性降低，长势衰弱，有的会局部枯死，甚至整株死亡。因此，冬剪后及时采取措施，对伤口进行消毒保护。所谓消毒保护，是指果树因修剪因素造成的伤口，其大小在1平方厘米以上的新老伤口，均宜进行消毒保护，涂抹消毒保护剂，以杀死其上的病菌，促进伤口愈合。

果园常使用的几种消毒剂有：

1.氧化锌涂剂。浓盐酸20克、热水300克、氧化锌1千克，75%的酒精1千克。先将热水倒入容器中，再将浓盐酸沿容器壁缓慢倒入热水中，稍搅拌，加入氧化锌，经搅拌使其溶解，并将此溶液倒入酒精中即可使用。

2.酸性升汞液。升汞50克、浓盐酸200克、水1千克。先将升汞溶于盐酸中，然后倒入水中即可。

3.液体接蜡。松香6份、松节油2份、动物油2份、酒精2份。先把松香和动物油同时加热化开，搅匀后离火稍降温再缓缓加入酒精和松节油，搅匀后装瓶备用。

4.牛粪石灰泥。鲜牛粪16份、熟石灰8份、草木灰8份、河沙1份。加适量水调匀成糊状即可。

5.波尔多液。硫酸铜1千克、石灰3千克、动物油300克、水15千克。先用少量的水将石灰化开，调匀，加水8千克，另将硫酸铜溶于7千克水中，最后两液同时倒入第3个大容器中充分搅和，并加入动物油即可使用。