实木转椅 水曲柳

产品名称	实木转椅 水曲柳
公司名称	田桂花（个人）
价格	.00/个
规格参数	材质:水曲柳 规格:高87*宽62*深46公分 颜色:枫木色，红木色，柚木色
公司地址	中国 江苏 南通市 江苏省南通
联系电话	86 513 15190916208 15190916208

产品详情

材质	水曲柳	规格	高87*宽62*深46公分
颜色	枫木色，红木色，柚木色	品牌	其它
分类	转椅	材质属性	实木家具
可否定做	不可以	可否折叠	不可以
贸易属性	外贸原单	脚架材质	水曲柳
扶手材质	水曲柳	框架材质	水曲柳
可否旋转	可以	适用场合	户外
产品类别	其他		

价格:电话15190916208 或邮件：britneytiantian@126.com联系，传真报价。

产品规格：产品高度为87公分，从脚跟部到靠背最上商的尺， 宽为62公分座位深度为46公分

整个椅子的材料均为水曲柳材质。做工细腻，光滑。

可360度旋转。

全实木做工柚木色枫木色红木色

是你居家，办公的最好选择。

使用此椅子显得您的身份高贵！！！

订购电话：15190916208 15190916808 qq383304791

曲柳以材质优良而著称，主要分布于我国东北黑龙江的大兴安岭东部和小兴安岭、吉林的长白山等地，向西还分布到辽宁的千山、河北的燕山山脉，以及河南、山西、陕西和甘肃的局部地区。水曲柳是一种落叶的乔木，高度可达30米，胸经超过1米。主根较短，但侧根发达，伐后的树根具有较强的萌蘖性。树皮多为灰白色。新生的小枝略呈心棱形，无毛、生有皮孔，冬芽为里褐色或黑色。枝上长有左右对生的奇怪羽状复叶，叶轴上有槽沟，还具有极窄的翅。它的花期为4～5月，花朵在长叶之前开放。花为单性，雄雌异株，雄花具有2枚雄蕊，雌花具有2枚不发育的雌蕊。受粉后的两性花结出长圆状披针形的翅果，在7～9月间成熟，翅果稍有些扭曲，顶端为钝圆形或稍微有些凹陷。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～拉丁名：fraxinusmandshuricarupr.中文名：水曲柳拉丁科名：oleaceae中文科名：木犀科保护级别：国家ⅱ级重点保护野生植物（国务院1999年8月4日批准）分布：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、河南、陕西、甘肃现状：渐危种。水曲柳是古老的残遗植物，分布区虽然较广，但多为零星散生。材质坚韧，纹理美观，是作家具的良材。因砍伐过度，数量日趋减少，目前大树已不多见。海拔下限(米)：200海拔上限(米)：1100形态特征：落叶大乔木，高达30米，胸径可达1米以上；树皮灰色，幼树之皮光滑，成龄后有粗细相间的纵裂；小枝略呈四棱形，无毛，有皮孔。奇数羽状复叶，对生，长25一30厘米，叶轴有沟槽，具极窄的翼；小叶7一11（一13），无柄或近无柄，卵状长圆形或椭圆状披针形，长（5一）8一14（一16）厘米，宽2一5厘米，光端长渐尖，基部楔形，不对称，边缘有锐锯齿，上面无毛或疏生硬毛，下面沿叶脉疏生黄褐色硬毛，小叶与叶轴联结处密生黄褐色绒毛。雌雄异株，圆锥花序生于去年枝上部之叶腋，花序轴有极窄的翼；花萼钟状，果期脱落，无花冠；雄花具之雄蕊；雌花子房1室，柱头二裂，具2枚不发育雄蕊。翅果稍扭曲，长圆状披针形，长2一3.5厘米，宽5一7毫米，先端钝圆或微凹。特性：水曲柳中心区为湿润型温带季风气候，土壤是发育在冲积母质上的草甸灰化棕壤或生森林土。多生长在河漫滩和山地河流下游的河谷第一阶地。主要伴生树种为红松pinuskoraiensissieb.etzucc.、鱼鳞云杉piceajezoensisvar .microsperma(lindl.)chengetl.k.fu.、长白鱼鳞云杉piceajezoensisvar.komarovii(v.vassil.)chengetl.k.fu.、紫椴tiliaamurensisrupr.、黄檗phellodendronamurenserupr.等。为阳性树种，幼龄期稍耐庇荫，成龄后需要充分光照。喜湿润，但不耐水渍，在季节性排水不良的地方，长势不佳甚至死亡，在干旱条件下生长较差，最喜山下腹湿润肥沃的缓坡及溪谷、河岸平地；稍耐盐碱，在ph值8.4，含盐量0.1%的盐碱地亦可生长；耐寒，在大兴安岭-40°C的严寒条件下发育正常，但人工幼苗易遭霜冻危害。主根短，侧根发达，伐根具有较强的萌蘖性，萌条生长迅速。早春先叶开花，花期4--5月。自然状态下，15--20年开始结实，翅果8月开始成熟。保护价值：水曲柳材质优良，是东北、华北地区的珍贵用材树种，可制各种家具、乐器、体育器具、车船、机械及特种建筑材料。同时，对于研究第三纪植物区系及第四纪冰川期气候具有科学意义。保护措施：分布区内仅个别地区建有自然保护区（如长白山等），多数地区尚无具体保护措施。建议有关部门选择适当地点及林份，建立保护点，保护好现存大树，并采种育苗，扩大造林面积。哈尔滨、长春、沈阳、北京等地已引种栽培。栽培要点：用种子繁殖。种子休眠期长，播种前必须采用低温层积和变温处理方法。育苗地应在平地上，选择排水良好的沙壤或壤土。造林地要选择山地的中、下缓坡，土层肥沃的地段。水曲柳如与落叶松混交造林和防止霜冻。还可采用萌芽更新法。