

上海温荷/2011荷兰球根朱顶红种球 Papillio 派比奥

产品名称	上海温荷/2011荷兰球根朱顶红种球 Papillio 派比奥
公司名称	上海市虹口区温鸿花卉商行
价格	48.00/个
规格参数	发芽率:100 (%) 品种纯度:100 (%) 生长适温:13-15 18-25
公司地址	中国 上海市 虹口区周家嘴路1106号B座119<<中荷温氏种业>>
联系电话	86 021 65451979 13816022378

产品详情

发芽率	100 (%)	品种纯度	100 (%)
生长适温	13-15 18-25	种类	种球

种球处理 种球消毒是种植的关键环节，一般采用常见的多菌灵、百菌清、甲基托布津等消毒剂处理。

- 1、种植 选用排水良好的富含营养的砂壤土或者介质进行栽植，种植时要露出1/3的球茎在土面以上。
- 2、温度和湿度 朱顶红属于不耐寒的冬春季开花的鳞茎球根花卉，生长期要求温暖、湿润的环境，最适生长温度为20-21 。刚种好的种球先放置在气温为13-15 干燥、通风的阴凉处15天左右，这样有利于根系的发育生长，为以后的抽叶、开花打下良好的基础。15天后待发芽长出叶片时，将种球移到通风良好、气温在18-25 、空气湿度在65-80%的条件下。朱顶红喜温暖湿润的环境，生育期间要求较高的空气湿度，若温室空气特别干燥，可以定期喷水以增加湿度，当花箭从球里长出来后，这段时间要每天适当通风。
- 3、光照 朱顶红较喜阳光，尤其在冬季，它需要充足的光照。刚种植时先放置在阴暗处以利生根，待二周左右发芽长出叶片后，逐渐多见阳光。大花朱顶红花萼的发育需要很多热量，待发芽长出叶片后再移到阳光直射处以便花箭抽出。
- 4、水肥 朱顶红浇水要适当，一般以保持盆土湿润为宜。刚种植时浇透水，之后少浇水，在发芽前基本上不要浇水，等到发芽之后加大浇水量。随着叶片的增加可增加浇水量，花期水分要充足，花后水分要控制，以盆土稍干为好。在球根发芽出叶前可以施点底肥，此外不需另外施肥。它的生长，主要是消耗自身营养。