

## 淄博樱桃苗 雷尼樱桃苗 临朐樱桃苗

产品名称	淄博樱桃苗 雷尼樱桃苗 临朐樱桃苗
公司名称	临朐城关街道西坦林果站
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县县城民主路北首秦池酒厂后西北角
联系电话	13853676013

## 产品详情

大樱桃苗采摘前后浇水管理.

采前水.采果前10~15天,为大樱桃果实迅速膨大期,拉宾斯樱桃苗,这个时期缺水,则果实发育不良,雷尼樱桃苗,不仅产量低,而且品质差.但突然灌大水,易引起裂果.因此这个时期,应注意少量多次.采前8天要控制浇水,雨后8天采收以保证果实品质.

采后水.樱桃采收后,正值树体恢复和花芽分化的重要时期,此时应结合施肥进行,以恢复树体,保证花芽分化正常进行.在水源充足的地方,采果后天气干旱时,要结合施肥、刨地进行,以加速发挥肥效,促进花芽分化.浇水量宜少不宜多,以水过地皮湿为好.此后如天气短期干旱有利于花芽形成.

樱桃苗分株育苗繁殖系数较高。一般每株母苗当年可分生6~7株砧苗,少数2~3株。分株当年6月份,每株母苗上一般有1~2株砧苗达到芽接粗度,可以进行芽接,当年出圃。部分砧苗可待8~9月份芽接,生产半成品苗,砂蜜豆樱桃苗,当年不足芽接粗度的,次春可再分株移栽,继续繁殖砧苗。分株苗分根以下的母苗部分,春季可行劈接。这样,应用分株法繁育砧苗时,当年一般每公顷可出圃成品苗7.5~9万株,生产半成品苗(接芽苗)18万~22.5万株,分株砧苗7.5万株左右。次春,还可生产部分板片芽接苗。

大樱桃苗的嫁接方法：

芽接：芽接的适宜时间,淄博樱桃苗,分为前期和后期。前期在3月中下旬的15~20天内;后期在7月中旬末至8月份,有时可延续至9月中旬,为期50天左右。嫁接过早,接穗幼嫩,皮层薄,接芽发育不充实。嫁接过晚,枝条多已停止生长,接芽不易剥离。

芽接时,先由接穗上削取接芽。接芽的芽片要大,一般长2.5厘米左右,宽约1厘米,以加大砧、芽形成

层接触面，提高成活率。接芽的芽片过小，不易成活。

接芽削好后，在砧苗近地面处横切一刀，长约1厘米，深达木质部。再从横刀口中央向下竖切一刀，长约2.5厘米左右，深达木质部。接芽片时，要用刀尖自上而下地轻轻剥开左右两片皮层，随将接芽轻轻嵌入砧木皮层之内。切忌硬推直插，以免搓伤接芽或砧木皮层，造成流胶，影响成活。/好，用宽约1厘米的聚乙烯薄膜条严密绑缚。芽接后，大约经过半个月可以愈合，20天后即可解绑。成活率一般在80%以上

。

淄博樱桃苗-雷尼樱桃苗-临朐樱桃苗(推荐商家)由临朐城关街道西坦林果站提供。行路致远，砥砺前行。临朐城关街道西坦林果站致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!