

儿童防打开CRC认证如何办理

产品名称	儿童防打开CRC认证如何办理
公司名称	深圳市南泥湾认证技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区福海街道凤凰创谷6楼
联系电话	13025453745 13025495299

产品详情

防止儿童开启测试

美国包装US 16 CFR § 1700.20认证所需申请资料：

- 1.申请表；
- 2.认证的产品资料（包括产品图片、产品图纸、体积等参数说明）；
- 3.测试样品至少保证400个。

US 16 CFR § 1700.20 测试要求：

（一）.儿童组

试验小组组成：

- (a)人数:200名儿童；
- (b)年龄与性别:年龄在42-51个月之间(包括42个月和51个月在内,以下同年龄和性别应均匀分布)；
- (c)尽可能代表整个国家人口的不同社会阶层、种族和文化背景；
- (d)身体健康,无明显的生理和智力缺陷,并有一定的动手能力；

(e)参加这种试验的次数不得多于一次(包括基于不同原理的各种开启型的包装试验)。如果让一个孩子参加一次以上的试验,则两次试验之间的间隔至少为一周。

防止儿童打开包装测试实验地点：

应在儿童熟悉的地点,如他们就读的学校或幼儿园进行试验,但应将试验儿童与学校其他人员分开并避免外来的干扰。应从人口分布不同的地区选择若干个地点,试验不定在同一地点、同一时间内完成。

试验方法：

(a)儿童试验应成对进行,每对应在一名公正的、有相应资格的、擅长于与儿童打交道的人员监督下进行。如果必要,在对与对之间互不干扰的情况下,在同一房间内可同时安排5对儿童进行试验。他们可以采用他们认为方便的姿势和位置。在试验过程中,如果某个儿童想溜走,监督人员应加以制止;并诱导该儿童回到自己的位置,要求他(她)继续进行,但不应给予打开包装的任何提示。这种情况应记录在试验报告中；

(b)在个5分钟内,即在示范前,将包装发给每个儿童,他们可以用自己愿意的任何方法打开包装,不要阻止儿童用牙齿或其他方法打开该包装。除作为儿童安全包装的一个部分所专门提供的工具或装置之外,不允许儿童使用任何其他工具或器具,在这种情况下,如果儿童没有注意到可以使用那种工具,直到示范前,均不必提醒他们注意；

如果某个儿童在5分钟内成功地打开了这个包装那么这个儿童应留在其试验区域,直到该时段结束；

(c)在第二个5分钟开始前,让在个5分钟内没有打开包装的儿童观看监督人员把一个包装打开并将其封口,不要把重点放在开启动作上,也不要有任何口头提示然后再给这些儿童5分钟去开启包装；

(d)每个5分钟时段后,应记录下某个儿童是否打开了包装。如果该儿童成功地打开了包装,应记录是在示范前还是在示范后。同时记录下是用牙齿还是用其他方法打开了包装。

对儿童组试验结果的判定：

(a)在没有示范的情况下,试验小组中至少有85%的儿童在5分钟内不能打开包；

(b)对在个5分钟内未打开包装的那些孩子作示范后,在第二个5分钟内仍有80%的儿童不能打开包装。

欧盟包装ISO8317认证申请资料：欧盟包装ISO8317认证所需申请资料：1.申请表：2.认证的产品资料（包括产品图片、产品图纸、体积等参数说明）3.测试样品至少保证200个欧盟包装ISO8317认证费用：包装ISO8317认证费用主要分为两部分：

欧盟包装ISO8317认证针对对象：ISO 8317认证，包括对儿童和老人的测试试验应用在以下两类人群：42个月~51个月大的儿童50-70岁的成年人

欧盟包装ISO8317认证流程：先准备填写申请表，提供申请的产品信息，进行报价之后，确定付款准备样品，进行测试测试完毕之后，测试数据

出口美国防儿童打开包装测试已经有了明确的要求，主要测试有部分ASTM-d3475标准测试，

第二部分CPSC测试。两种测试根据客户对产品的要求，可以只做其中一种测试，也可以ASTM-

d3475与CPSC一并测试。无论您需要哪一种测试，我们都可以帮您提供测试服务，出具测试报告。

部分：ASTM-d3475产品包装标准防儿童拆开包装测试：

1970年，美国国会就通过了危险物品包装法案，授权美国消费产品安全委员会来规范产品包装的安全标准。本

次测试以：美国消费产品安全委员会新规范的产品包装安全标准《ASTM-d3475-15儿童安全包装的标准分类》进行测试，出具测试报告。ASTM-d3475测试事项：1.前五分钟由儿童自由打开，对打开和未打开的数量进行统计；

2.大人在儿童面前打开，然后在装好给到儿童，10分钟内看儿童自由打开和未打开的数量进行统计。第二部分：CPSC防儿童打开包装测试：美国消费品安全委员会(CPSC)对包装袋，挤压瓶，儿童防打开安全盖，防止儿童打开包装的产品的测试要求CFR- 2016-title16-vol2-sec1700-20