

# 优质金线鱼（红衫、红哥鲤、吊三、拖三、瓜三、黄肚）IQF/BQF

产品名称	优质金线鱼（红衫、红哥鲤、吊三、拖三、瓜三、黄肚）IQF/BQF
公司名称	阳江市海惠工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海惠 卫生许可证:4400/02063 产品标准号:GB/T18109-2000
公司地址	阳东县东城镇始兴南路96号
联系电话	13703058358 13922003790

## 产品详情

品牌	海惠	卫生许可证	4400/02063
产品标准号	GB/T 18109-2000	净重	10kg (g)
原料与配料	海捕鱼	保质期	730 (天)
原产地	广东	生产厂家	阳东海裕水产有限公司
储藏方法	请保存于零下18度	等级	A
规格	IQF/BQF	生产日期	3-12月
售卖方式	包装	特产	否
产品类别	其他		

规格：50/100 100/150 150/200 200/300 300/400 400/500 500up

优质金线鱼（红衫、红哥鲤、吊三、拖三、瓜三、黄肚）iqf/bqf，10kg/ctns（可根据客户要求）

厂家直销，质量上乘

## 金线鱼

俗名: 红衫、红哥鲤、吊三、拖三、瓜三、黄肚。拉文种名 sinocyclocheilus grahmi(regan) 产地及产期: 分

布于北太平洋西部、我国产于南海、东海和黄海南部，其中南海产量较多、主要渔场有南海北部湾各渔场。介绍:体延长，倒扁，背腹缘皆钝圆，一般体长19~31厘米、体重50~150克、吻钝尖，口稍倾斜，上颌前端有五颗较大的圆锥形齿，上下颌两侧皆有细小的圆锥齿。体被薄栉鳞、全体呈深红色，腹部较淡，体两侧有6条明显的黄色纵带、背鳍长；尾鳍叉形，其上叶末端延长成丝状。背鳍及尾鳍上缘为黄色，背鳍中下部有一条黄色纵带，臀鳍中部有2条黄色纵带。

资源量分布于云南三个湖泊的金线鱼以滇池最多,自70年代起由于污染造成水质富营养化,沿岸居民和工厂从地下水出口洞穴内抽取地下水,且砌石为池,使洞口与滇池的通道隔断,破坏了金线鱼的洄游产卵环境,现在滇池的金线鱼已基本绝迹。抚仙湖和阳宗海的生态环境无多大变化。生活习性

温水性高原湖泊特有小型名贵鱼类。

生活于18~220公尺海域，喜栖息于沙泥底质地区。肉食性，以小鱼及甲壳类为主。繁殖期在5~6月。

保护措施

今后在抚仙湖和宗阳海应加强生态环境的保护,使金线鱼这一物种不至于在我国云贵高原湖泊绝迹。

## 金线鱼

俗名:红衫、红哥鲤、吊三、拖三、瓜三、黄肚。拉文种名 *sinocyclocheilus grahami*(regan) 产地及产期:分布于北太平洋西部、我国产于南海、东海和黄海南部，其中南海产量较多、主要渔场有南海北部湾各渔场。介绍:体延长，倒扁，背腹缘皆钝圆，一般体长19~31厘米、体重50~150克、吻钝尖，口稍倾斜，上颌前端有五颗较大的圆锥形齿，上下颌两侧皆有细小的圆锥齿。体被薄栉鳞、全体呈深红色，腹部较淡，体两侧有6条明显的黄色纵带、背鳍长；尾鳍叉形，其上叶末端延长成丝状。背鳍及尾鳍上缘为黄色，背鳍中下部有一条黄色纵带，臀鳍中部有2条黄色纵带。

资源量分布于云南三个湖泊的金线鱼以滇池最多,自70年代起由于污染造成水质富营养化,沿岸居民和工厂从地下水出口洞穴内抽取地下水,且砌石为池,使洞口与滇池的通道隔断,破坏了金线鱼的洄游产卵环境,现在滇池的金线鱼已基本绝迹。抚仙湖和阳宗海的生态环境无多大变化。生活习性

温水性高原湖泊特有小型名贵鱼类。

生活于18~220公尺海域，喜栖息于沙泥底质地区。肉食性，以小鱼及甲壳类为主。繁殖期在5~6月。

保护措施

今后在抚仙湖和宗阳海应加强生态环境的保护,使金线鱼这一物种不至于在我国云贵高原湖泊绝迹。