

山林月季 树状月季图片 树状月季

产品名称	山林月季 树状月季图片 树状月季
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

产品详情

树状月季关键病害防治

提升树状月季种植管理方法，避免偏施基肥；春、夏梢抽发期和花瓣完善前，可采用代森锰锌、松树枝酸铜、代森锌、百菌清等喷布树干，半个月上下喷一次，持续3-4次。

树状月季脚腐病

立即排水管道，改进园里透光性自然通风标准，提升对天牛和别的的树杆虫害的防治；对已感病主茎，可用抗病性粘木接换砧。药剂避免：刮除病斑后上药，常见药剂有酮、托布津等。

螨类

（柑橘飞虱、四斑黄搜索引擎蜘蛛锈壁虱）。盛开前后左右（3-5月）和秋天（9-11月）是防治飞虱的关键阶段：花时虫口相对密度达1-2头/叶，花谢和秋天达5-6头/叶即需开展防治。常见药剂有螨酮、达螨灵、炔螨特、螨酯、双甲咪等，留意维护长须螨、钝螨、食螨瓢虫、日己方头甲和草蛉等克星。

蚧类

（矢尖蚧、红蜡蚧、吹棉蚧等）。防治关键阶段：矢尖蚧为第yi代幼虫期，红蜡蚧为幼虫期很多上梢危害阶段（一般为5月上、中下旬至6月中下旬），吹棉蚧为幼虫盛发环节。常见药剂阴啉酮、杀扑磷、碱、乐斯本、汽车机油溶剂等。留意改进园里自然通风透光性标准；维护和运用日己方头甲、小红点唇瓢虫、草蛉、金子蚜小蜂、澳大利亚瓢虫、大红色瓢虫等克星。

潜叶蛾

防治的关键阶段为夏、秋梢抽发期（7月上旬）。立即清掉零星抽发的夏秋季梢，树状月季用什么树嫁接，融合液肥管理方法，促进主茎抽发的新梢健硕齐整。药剂防治：新梢抽发至1-2cm时打药，7-10天喷一

次，持续2-3次。常见药剂有阿维菌素、杀螟丹、氯氟菊酯等。

天牛类

5-8月，大晴天下午人力星天牛和绿桔天牛若虫，黄昏褐天牛若虫；立即消除幼虫、初孵幼虫和剪去受害枝杈；用棉絮或纯棉纱淋湿等灭虫剂吡菌胺后阻塞虫孔，再将虫孔用土壤封闭式，以幼虫。

盆栽月季管理

施肥：喜肥，为加速苗木生长，培育理想的棵型、美丽的花朵，不仅要有底肥也要及时追肥。根据天气、气温，少施、勤施，切忌早施、暴施，产生肥害。在冬季修剪后至萌芽前应施足有机肥料做底肥。春季开始展叶时新根大量生长，不能施用浓肥，以免新根受损，影响生长；月季盛花期，需肥量大，应少施勤施；秋末应控制施肥，树状月季嫁接，以防秋梢过旺受到霜冻。施肥时，树状月季图片，要结合植株长势，进行科学肥水管理。在生长旺季，可用磷酸二氢钾、高美施、等每5、6天叶面喷肥一次，促进花蕾迅速生长；也可用腐熟发酵的鱼腥汁、菜叶汁，以3份肥7份水的比例拌和施入，或将豆饼、禽粪用水浸泡，经封闭发酵后掺水作追肥，使植株花繁叶茂。

树状月季的嫁接方法之枝接法

枝接法通常在月季生长季节使用此方法，选择合适的月季枝条接穗削切，每一段中均存在芽3个左右，整理选好的枝条，将其基部削平，基部向上30°较位置切削，连接基部刀口部位，确保切处没有毛刺，不会导致木质部与皮层出现分离情况。

在潮湿纱布上放好接穗，保证其具有充足水分，剪除选好的砧木上部位置，以横截面为中心向下斜切或者竖切，刀口深度与接穗呈30°角，保证接穗与砧木能够完全贴合在一起，包装沐风接穗位置，确保其具有充足水分，树状月季，种植成功后，做好修剪工作，注意水肥管理。

山林月季(图)-树状月季图片-树状月季由南阳市卧龙区山林月季种植合作社提供。南阳市卧龙区山林月季种植合作社为客户提供“花卉,月季树批发,树状月季,苗木种植及销售”等业务，公司拥有“山林月季”等品牌，专注于花木等行业。，在南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李长华。同时本公司还是从事盆景月季，南阳盆景月季，河南盆景月季的厂家，欢迎来电咨询。