

# 中药原药（鸡爪黄连）黄连

产品名称	中药原药（鸡爪黄连）黄连
公司名称	四川省天奇药业有限公司
价格	95.00/千克
规格参数	品名:黄连 产品属性:根茎类
公司地址	中国 四川 成都市 成都市金牛区洞子口乡古柏村
联系电话	86-02866557459 13350093716

## 产品详情

品名	黄连	产地	中国黄连之乡——石柱县 黄水镇
产品属性	根茎类	性状	鸡爪
性	微寒	味	苦
归经	肝、大肠	毒性	无毒
化学成分	黄连素	产品形态	原形态
炮制工艺	晒制	规格	统货

中药原药（鸡爪黄连）[www.sctianqi188.cn](http://www.sctianqi188.cn)

干货——从事代收代发业务。每公斤只收1元的手续费。

中国黄连之乡——石柱县黄连中药材[www.sctianqi188.cn](http://www.sctianqi188.cn)，又名味连、鸡爪连，南岸连、有1300多年的历史，现有gap基地5万多亩，占全国年总产量的68%以上，占世界年总产量的40%以上。它含小檗碱（黄连素）达到约6.5%~10%，位居全国第一（其它同类产品含量在5%左右）。石柱黄连始于元末明初（约1360年）、石柱黄连被李时珍列为120种中上品。1979年石柱被命名为“中国黄连之乡”。1985年石柱黄连被编入《中国土特产辞典》、《中国的世界之最》。1989年被确认为“地道药材”，2004年获得国家“地理标志产品保护”认证，石柱黄连品质优良闻名于世，现主要出口欧美、日本、东南亚、韩国等50多个国家和地区。黄连味苦、寒，《本草纲目》记有清热解毒、泻火消炎、降压、利胆、抗病毒，治呕吐、牙痛、妇女阴中肿痛等多种药用功效，它是在黄水国家森林公园大风堡原始森林独特的气候、水质和土壤中生长的，是“大山的馈赠，土家的骄傲”，在日本、韩国及东南亚、西欧等市场倍受欢迎。现在，黄水镇是国家黄连gap示范基地，建有中国最大的黄连交易市场，已开发的黄连系列旅游商品是旅游购物、馈赠亲朋之佳品。

附注：黄连

（一）概述 别名王连、宣连、川连、鸡爪连等。为毛茛科植物。主要栽培种有黄连（味连）（*Coptis*

chinensis franch. ) 和三角黄连 ( 雅连 ) ( *C. deltoidea* C. Y. Cheng et Hsiao ) , 以根状茎入药。有清热燥湿、泻火解毒作用, 凉血明目, 除湿热止泻痢, 治心火肝热、头晕、目赤、烦躁、热毒。

(二) 植物特性 多年生草本。地下根茎多数分枝, 表面粗糙, 黄褐色, 须根多而细长。叶丛生、叶柄长, 小叶3~5枚, 边缘深裂成羽状, 有锯齿, 淡绿色有光泽。花茎春末抽出, 高100厘米, 顶生圆锥聚伞花序, 花小, 黄绿色。骨突果成熟开裂, 种子小, 黄褐色。黄连喜欢冷凉、湿润, 忌高温干燥。

(三) 生长特性 黄连喜生长在高山阴湿冷凉, 透光度30%~40%, 忌强光、高温、干燥、积水的地方。土层肥厚、排水良好、土壤湿度50%~60%左右。种子有胚后热阶段, 经低温才能发芽, 特别是苗期耐光能力差, 苗越大抗光能力增强。(四) 栽培方法 1. 整地遮荫 过去一直采取搭架。遮荫, 破坏森林太厉害, 现在利用林下栽和玉米套作、或搭简易棚, 透光度保持在40%左右即可, 排水良好, 土壤湿度50%~60%左右, 怕积水和直光, 选择半阴半阳, 15~25度坡地为好。整地: 先把地表的残渣及石头等杂物清除出棚外, 堆成堆, 熏烧成黑土, 再翻挖2次, 整细耙平。然后顺着坡向整成宽130~150厘米, 高10厘米的高畦(厢), 沟宽16~26厘米, 畦面呈瓦背形, 并在棚的周围开好排水沟。畦整好后, 每公顷施腐熟牛马粪60000~75000千克; 捣碎均匀铺于畦面, 然后浅挖, 与表土拌匀, 再覆盖6厘米左右的熏土。遮荫: 多采用架子棚和简易棚。架子棚是采用砍去竹丛和树木, 均作遮荫材料, 长216厘米, 桩距200~230厘米, 行距160厘米, 柱埋深30~50厘米, 桩高都是160厘米, 再搁上檩子及横杆, 上面盖遮荫物, 荫蔽度要均匀, 约60%~70%。

简易棚: 用3~5厘米粗的木叉作极, 棚高80~100厘米, 边栽边搭, 栽完一畦, 搭一棚。2. 繁殖方法 用种子育苗繁殖和扦插繁殖两种方法。(1) 种子繁殖法 采种: 立夏前后, 采移栽3年以上健壮植株所结的种子, 当种子呈黄绿色即应采收, 晴天摘回果枝堆放室内1~2天, 即可脱粒, 忌日晒, 保持湿润, 低温处理, 完成种胚后熟。生产中采用温床或腐殖质混合均匀, 埋于窖中厚3厘米, 上面再覆盖沙或腐殖质土3~6厘米厚, 再盖树枝保湿, 经常检查。育苗 精细育苗 选半阴半阳湿润肥沃的杂木林或二荒地, 砍除杂草和不需要的条木烧炭作肥, 搭80厘米左右荫棚及栏边、并深翻土地23厘米左右, 做130厘米宽的高畦、畦沟宽30厘米, 畦面平整, 呈弓背形, 无碎石、树根, 土细, 每公顷施腐熟牛、马粪15000~22500千克, 畦面盖1.5厘米厚的熏土。11月份左右取贮藏的种子、拌好20~30倍腐殖质土、均匀撒在畦面(每公顷用种37.5千克左右), 再撒牛粪粉或草木灰0.6厘米厚。第二年春苗长出3片叶时结合除草追施清粪水或尿素, 施化肥应分多次少量, 硫酸按每公顷施75~112.5千克, 最好是在晴天叶上无露水时撒施, 再用小竹枝轻轻扫一下, 使药掉落, 防止烧苗。6月份施腐殖质土培土保苗, 11月份每公顷施细牛粪或马粪拌草木灰11250千克, 利于幼苗越冬。林间青苗 选荫蔽度在80%以上, 林高度在300厘米以下的树林。地整好后每公顷播种75千克左右的种子, 播法基本同精细育苗, 于2月中下旬出苗前, 清扫一次落叶, 出苗后至移栽前应进行2~3次拔草施肥, 此法节省劳动力。移栽: 出苗第二年春移栽, 按行株距10厘米\*10厘米, 深3-5厘米栽。此外还可采用林间栽黄连, 使遮荫在70%左右做自然天棚, 方法同上。也可与高秆作物早熟的玉米间作, 先播玉米, 按株距30厘米开穴, 插入畦的两旁, 每穴3-4粒种子, 定苗留一株苗, 7月份玉米封垄, 在畦中, 玉米行间按行株距10厘米\*10厘米栽黄连苗, 玉米收后, 在畦两旁搭100厘米高的架子把五米秆均匀放在架上遮荫, 每年重新播种玉米, 第二年株距40厘米, 第三年50厘米, 第四年60厘米, 第五年60~100厘米。(2) 扦插繁殖 在种子或幼苗缺少的地区可采此法。即在黄连栽培5年后, 提早于8~9月收获, 收获后将黄连植株自根茎顶端以下0.1~0.13厘米处连茎叶摘下(剪), 作插条用, 随剪随栽。栽时应将叶柄全部埋入土中, 只留叶片在外, 并压紧即可。此方法的整地、做畦、施肥等与上相同, 亦要5年才能收获。3. 田间管理 想使黄连高产优质关键在于田间管理, 应注意追肥除草, 栽后3~5天, 有缺苗立刻补之, 并要施肥、清粪水或猪粪水助苗成长, 发根后一个月施硫酸铵7.5~10千克, 10~11月每公顷施腐熟牛马粪30000~37500千克, 前期以氮肥为主, 后期再撒一层薄熏土, 以后每年春秋各施肥培土一次, 春季每公顷施硫酸铵112.5~150千克或人粪尿或腐殖质上15000~22500千克, 冬肥每公顷37500~60000千克腐熟牛马粪或饼肥过磷酸钙、石灰等。冬肥施后都要培熏土, 3、4年后少施氮肥或不施氮肥。以磷、钾肥为主, 注意收获前不能追肥。黄连从小苗至收获除草很重要, 见草就除, 小苗期用于拔, 做到除草。除小、除净, 除草同时注意培土, 先薄后厚逐年增加, 第二年1.5厘米厚, 第三、四年1.5~3厘米厚。在管理中应注意调整遮荫度, 3年内遮荫要经常检查, 有缺遮荫者赶快遮上, 遮荫逐年减少, 如果是架子棚, 在收获当年于种子收后, 揭去遮荫材料, 让黄连在日光下生长, 使养分向根茎转化, 使根充实, 如做扦插繁殖材料的黄连, 至收时才能扯棚, 若林间栽黄连, 栽后第三年开始砍修树枝, 遮荫50%, 第四年30%, 第五年20%。4. 病虫害防治 (1) 白粉病 多发生在当年新叶上, 起雪白色粉, 后呈水浸状, 叶逐变红暗褐色。此时可用猪粪水追施, 使苗返青, 再用0.3~0.5波美度石硫合剂喷洒防治。(2) 鼠害及兽害 黄连的兽敌很多, 如鹿子、锦鸡、鼠类等。危害黄连嫩叶、花茎及种子, 有的也危害根状茎, 一般发生在12月至翌年4月的寒冷季节。防鼠可用磷化锌和玉米粉按1:20拌

成毒饵撒于田间或鼠洞内。（五）采收加工 栽后第五年10~11月份收获。整株黄连挖出，抖掉泥沙，再将须根及地上部一起剪掉，须根及叶分别晒干，供兽用。根状茎单独烘干，炕时火力要均匀，开始时火力不宜太强，应徐徐加大，一般根状茎容易折断，断面呈甘草色时即可出炕，趁热放入槽笼里，推撞掉残存泥沙、须根及叶柄即得成品。

四川省天奇药业有限公司www.sctianqi188.cn

联系人：秦华

电话：13350093716