

青年鸽价格 青年鸽 山东中鹏农牧

产品名称	青年鸽价格 青年鸽 山东中鹏农牧
公司名称	山东中鹏农牧有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安东平县白佛山西侧于寺村往北（原金牛农场）
联系电话	15253896577

产品详情

现在养鸽子的大有人在，有人大规模养殖是为了利润，把种鸽养殖作为自己的事业，还有的人单纯处于个人爱好，就是单纯喜欢鸽子所以自己平时喜欢养上几只。

在农村地区养殖鸽子是比较普遍的，因为这里有空间的优势，这里的闲置土地比城里边要大，我们知道养鸽子是需要一定的空间要求的，对于种鸽基地来说，这点是需要满足要求的。合理的空间既是出于对鸽子的生理需求的考虑，另一方面也方便空气流通，减少发生疾病的可能。

但是如果在城里想要养鸽子怎么办呢？住楼房的人想要养鸽子首先就要找到合适的位置了，这个时候有人就打起了储藏室的主意，泰安某小区有居民把鸽子养在了储藏室，然而造成了，附近居民受到了影响多是苦不堪言，鸽子养殖还是会造成一定的环境污染，这点是我们养殖户需要注意的。

种鸽企业提醒各位，在养鸽子的同时，如果是出于兴趣爱好，千万不要因为自己而影响到别人，而且阴暗狭窄的环境对于鸽子的生长也是不利的，不如综合考虑，创造条件为鸽子营造一个舒适的家吧。

说到种鸽的产卵，可能会有一下几种情况出现：产下没有蛋壳的鸽蛋、一轮只产下单独1枚鸽蛋、一轮下3枚鸽蛋、产下形状细小的鸽蛋、蛋内只含蛋白而没有胚(通常会出现在雌鸽的蛋)、各种原因的没有受精的鸽卵，像是已没有、产蛋数量过高以致供应不足够、缺乏或失调、雌鸽过于等等。

我们都知道，蛋壳是自末端的分泌物形成的，这部位的腺体自血液抽取钙和二氧化碳，青年鸽养殖场，且将它们构成硫酸钙(白垩)。血液中的钙浓度(即血钙)要稳定，这对生命的维持是非常重要的，因此，青年鸽，于构成蛋壳时自血液中抽取出来的钙质就必须及时获得补充(自种子、啄石和矿物质)。

必须指出，为了于40个小时~44个小时能提供足够的钙质以构成2枚蛋壳，雌鸽是没有足够的时间自食物中摄取必需(足量)的钙质的。这时，大部分的钙质却是抽取种鸽体原先的贮存，那就是它们的空骨。就算你只就上述这项钙的代谢考虑也好，已可以了解到雌鸽的产蛋实在不是容易的事情。

正如前文我早就指出过的，不该将雌鸽当做产蛋机器来使用，合宜的方式是让雌鸽每回能完成它的整个繁殖周期(循环)，这就是产卵、孵蛋和哺育仔雏。

尚有另外也是末一个该提到的例子，可用以说明雌鸽产蛋是相当费力的。这是一个故事，且广为流传于荷兰种鸽界。

1986年的圣维仙赛，荷兰的全国是一羽雌鸽，由于它的种鸽舍位于北荷兰，因此飞距较绝大部分的竞赛对手多约100公里。于获胜完翔后的数天，它却猝然不幸地于正欲产出第二枚鸽卵的时候，可以这样说，青年鸽规格，它于翔赛时所付出的体能，是让它后走上不归路的主因。

只有在足量的维生素A和特别是维生素D3的协调下，鸽体才可以摄取到足够的钙质。鸽体的维生素D3是由它的先质构成的

(大部分是存在于鸽子足爪的皮肤上)，这些维生素D3的先质再转变成为维生素D3，而其中的必要条件就是要获得日光光线中的紫外线照射。不过，若为了安全

(或安心)起见，于配对前还是给种雌添补维生素D3为宜，并且于每一个繁殖周期的中间也宜给予添补，特别是那些经常被关饲的种雌和进行冬季繁殖时。若这一过程有任何脱轨的状况发生时，我们可以预估到雌鸽会产下蛋壳质甚劣的鸽蛋，甚而是没有蛋壳。

电脑孵化鸽蛋技术是利用肉用种鸽孵化机代替种鸽自然抱孵，使种鸽免去孵化过程，缩短产蛋间隔周期，增加产蛋量，避免亲鸽孵化时因温度、湿度、猫(鼠)惊吓、人员操作等原因造成破蛋、凉蛋，从而提高孵化率和出雏率。孵化应根据鸽蛋特点及胚胎发育规律进行，并要先少量试验，稳定几批后方可大批进行。具体操作技术如下：

取蛋

在每天晚上8时以后或第二天上午10时前，将种鸽产的鸽蛋全部取出，过早或过迟，均会给孵化带来不良影响。取蛋时须将垫布一同取出，以免种鸽恋巢抱窝影响下一轮产蛋。同时，做好种鸽产蛋时间和鸽蛋标记记录。

选蛋

应挑选大小均匀、色泽新鲜的种蛋。过大的双黄蛋、过小的珍珠蛋、畸形蛋、沙壳蛋、裂纹蛋及病鸽产的蛋均不得入机孵化。将选好的种蛋保存在通风干燥处，青年鸽价格，温度10 ~ 20 ，相对湿度在45 %左右，保存期为3天~5天。

孵化记录

将入孵鸽蛋数、无精蛋数、死胚蛋数、弱雏数、健雏数等作详细的记录，并建立档案，随时根据孵化鸽蛋、出雏质量调整好鸽群，这对提高受精率和出雏率起着非常重要作用。

入孵时间

一般在上午10时入孵。立式蛋盘装蛋时鸽蛋小头朝下。孵化机温度全期控制在37.8 ~ 38.3 ，相对湿度为40%~50%，每两小时翻蛋1次。孵15天~16天落盘。如使用孵化出雏一体机，要把鸽蛋放于下部出雏盘内，停止翻蛋。出雏盘温度是孵化机内的(37.3左右)，正好适合出雏时的温度要求。出雏盘内应铺一层细尼龙纱网，防止雏鸽出壳后别伤腿。

照蛋

鸽蛋每批孵化3天~5天，要进行次照蛋，将无精蛋及时剔除；孵至10天时进行第二次照蛋；孵化15天~16天落盘时，进行第三次照蛋。在照蛋时及日常检查中及时剔除无精蛋、死胚蛋、破蛋、裂纹蛋，防止胚蛋变臭或污染孵化机。孵化过程中如发现孵化机异常或胚胎发育异常，应及时查明原因并对应解决。

晾蛋

将已孵化12天以上的胚蛋放在孵化机外晾至蛋温30℃再放回，可大大提高出雏率和健雏率。

调盘

普通的孵化出雏一体机的温度特点是上层，越向孵化机下层温度越低，而鸽蛋的胚胎发育特点是前7天需温高，8天~11天自身开始产热，胚龄越大需温越低。所以每天或每次入孵时均把新入孵蛋放于孵化机上层（孵化机内温处），把先入孵化机的胚蛋依次往下调（调往温度稍低处），也可新旧蛋交替排放，可明显提高出雏数量。采用全进全出的变温孵化法不用调盘。

出雏

鸽蛋孵化17天便陆续有雏鸽出壳，雏鸽毛干后即可取出，一般每3小时~4小时取1次。取一次雏鸽清理一次蛋壳，把剩下的胚蛋集中在一起，防止空壳套在未破壳蛋上导致雏鸽窒息。后把啄壳8小时而无力出壳的进行剥壳助产。

注意

每次出雏结束后，均应把出雏盘、纱网及用具等清洗消毒。必须定期停机检修，清理消毒，防止因孵化机内污染而导致出雏率下降。在孵化期间，注意通风，通风量前期小点，后期稍大些。

青年鸽价格-青年鸽-山东中鹏农牧(查看)由山东中鹏农牧有限公司提供。山东中鹏农牧有限公司为客户提供“种鸽,鸽子,鸽场,鸽厂,商品鸽,鸽蛋”等业务，公司拥有“种鸽,鸽子,鸽场,鸽厂,商品鸽,鸽蛋”等品牌，专注于禽类等行业。，在山东泰安东平县白佛山西侧于寺村往北（原金牛农场）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李冠连。