

大花棒棒糖月季造型树 棒棒糖月季造型树 春诚苗木配送

产品名称	大花棒棒糖月季造型树 棒棒糖月季造型树 春诚苗木配送
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

产品详情

夏季修剪在8月末~9月初。夏季气温高，月季进入半休眠期，集中回剪枝叶，棒棒糖月季造型树，修剪到整体的2/3~3/4，大花棒棒糖月季造型树，每根枝条保留叶片3枚以上。同时，夏季一般不让其开花，各种花色棒棒糖月季造型树，在新枝长10cm时摘心，直到9月初。

二、整枝

月季的方式以丛状形为宜。树状月季批发商提醒你若主枝皮色暗黑，应从基部疏去，用基部新生枝代替；若主枝皮色青嫩，实行重剪，继续培养；若主枝数量过多，留3~5个丛生枝，剪除弱枝、病残枝和交叉枝。

三、抹芽

在萌芽时，抹去多余的芽和位置不好的芽，减少养分消耗。除主枝上留2~3个外，其余的统统抹除。

四、疏蕾

新上盆的幼株，初次花蕾要及时摘除，使它积累养分促枝发棵。

花蕾形成后，若数量过多，应摘除部分花蕾。对单枝开花的杂交茶香月季，保留中间的花蕾，其他的侧蕾都可摘除；对丰花、壮花月季，为保证同时开放大量花朵，摘除主蕾和部分过密的小蕾，可使花期相对集中。

南方地区夏季温度较高，月季长势较差，为避免消耗养分，出现的花蕾应及时摘除，这样，可积累更

多的养分为秋冬季节产花提供基础。

常用的化肥配方有：尿素1kg、过磷酸钙2kg、硫酸钾2kg混合后及时施用，每株40g。或是尿素1.1kg，普钙3.17kg、硫酸钾3.17kg，硫酸镁0.45kg混匀后，立即使用，不宜久存，每株用量28g。

施肥时间及方法:施肥通常在灌溉后几天，土壤不太干不太湿时进行，将肥料均匀地撒在离茎20~25cm以外的植株周围。如果植株密度较大也可采取条施，即撒施在植株的行间，然后浅耕松土，帮助肥料溶解渗透。

树状月季黑斑病菌以菌丝或分生孢子在芽鳞、叶痕、枯梢和落叶上越冬。次年春天降雨后发生分生孢子，借风雨，喷溅水传达，由表皮直接侵入。在适合的温湿度条件下，潜伏期至短3-6天可呈现症状，发病至叶片掉落约经8-32天，气温高时病叶掉落期缩短。3月下旬至6月中旬和9月下旬至11月为发病盛期。多雨、多露和台风雨后闷热，通风透气不良，以及弱株和老株，发病均较严峻。一般“金不换”、“金鱼红”、“和平”、“金枝玉叶”等种类易感病。“伊丽莎白”、“黑千层”、“伊斯贝尔”等种类较抗病。未发现种类。

树状月季黑斑病防治办法：

- 1、随时清扫落叶，摘除病叶，修剪控制枝条密度。浇水采用滴灌、沟灌或沿盆边洒水，高杆棒棒糖月季造型树，尽量缩短水滴在叶面滞留时刻，保持叶片干燥。
- 2、用1%硫酸铜喷洒表土，或用木糠、煤灰覆盖表土，厚度8毫米左右，可抑杀地表部分病菌，减少侵染机会。
- 3、发病期间，喷洒75%百菌清600-800倍液或嘧啶灵1000倍液。

大花棒棒糖月季造型树-棒棒糖月季造型树-春诚苗木配送由方城县春诚月季种植基地提供。行路致远，砥砺前行。方城县春诚月季种植基地致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。