

绿壳蛋鸡苗厂家批发 惠民禽业 昆明鸡苗厂家批发

产品名称	绿壳蛋鸡苗厂家批发 惠民禽业 昆明鸡苗厂家批发
公司名称	广州惠民禽业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区竹料大道东29号之二105-106
联系电话	13570938602 13570938602

产品详情

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市兽牧局批准注册。是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。也是一家供应鸡苗，鸭苗，鹅苗，珍禽厂家，主营：麻鸡苗、三黄鸡苗、乌鸡苗、土鸡苗、珍珠鸡苗、高产绿壳蛋鸡、快大黄鸡苗等、全力打造系列禽苗优良品种。公司主营：绿头野鸭苗，鹅苗，马岗鹅苗，竹丝鸡苗，火鸡苗等等。

鸡苗痛1风症的症状及诊治方法

一、病因 引发鸡痛1风症的原因很多，其中主要的原因是由于尿酸盐在体内广泛沉积所致。造成尿酸盐沉积的常见原因有四种：日粮中蛋白质比例过高，经脱氨后形成的尿酸盐过高，超过了1脏的排泄能力；由于磺1胺类用量过大或高钙低磷对肝功能造成损害；因呼吸道病、新城疫等疾病损害1脏，使尿酸盐排泄受阻，引起尿酸盐沉积；因鸡舍通风不良，氨气浓度过高，损害了鸡体的呼吸与排泄系统功能，致使尿酸盐在体内沉积。二、临床症状 1.内脏型痛1风症。病鸡精神不振，食欲减退、消瘦，贫1血，被毛蓬乱，鸡冠苍白，腹泻，拉白色石灰样稀粪，松弛、粪便失禁，发病3~5日后常因衰竭而，鸡冠呈紫黑色。2.关节型痛1风症。由于尿酸盐在关节囊内沉积，病程较长，初期病鸡精神萎靡，采食量减少，行走不稳，活动困难，有明显的跛行；各关节肿大，有些脚掌趾关节肿胀变形；采食停止，机体消瘦，瘫痪，不能站立，一般1周左右。三、诊断和防治 根据临床症状和剖检症状基本能够确诊该病。

养鸭业的生物安全和疾病预防

养鸭业是我国的特色产业和农村经济发展的支柱产业之一，目前我国鸭的饲养量占全世界的60%以上。中国幅员辽阔，有众多的江、河、湖泊、滩涂水面，适宜养鸭产业的发展。要促进我国由传统养鸭业向现代养鸭业跨越发展，必须牢牢把握生物安全和疾病防治这一关。生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护鸭群免遭致病微生物的侵袭，建立一道屏障，避免病原体扩散到健康鸭群。在现今的规模化

、集约化养殖模式下，草鸡苗厂家批发，鸭群始终受到致病微生物的威胁，生物安全的好坏是现今养鸭业能否成功和获利的关键。生物安全是通过减少环境中性微生物的数量来预防控制疫病，是一项省时、省力、省钱的预防措施。

控制源人员的控制 大多数疫病可通过人进行传播，包括参观者、邻近养鸭户、鸭场内部的工人、服务人员，以及参与接种、鸭子和饲料销售员等，进入鸭场的人员都必须进行消毒。平时鸭舍的门应当上锁，未经许可者不得入内。车辆和设备的控制 鸭场的大门出入口应设车辆消毒池，所有进入鸭场的车辆包括送种车、服务车、运送鸭子的车辆都必须进行消毒，特别是车辆轮胎、底盘和车厢外部均要消毒。所有送进鸭场的设备均要消毒。如有尘土、粪便或其他一些有机物质存在的情况下，首先要将所有消毒的物体表面用水清洗干净，然后按消毒剂的使用说明进行喷洒消毒。动物和昆虫的控制 养鸭场禁止饲养食用动物、啮齿类动物和鸟类动物，因为它们可能成为疾病的生物和机械携带者，可传播像沙门氏菌和巴氏杆菌这样的病原菌。如马立克氏病病毒和禽痘病毒可通过蚊蝇和其他昆虫传播。因此，有效的粪便处理和死禽处理将有助于减少昆虫蚊蝇的数量。应当定期喷洒允许使用的杀1虫剂来控制昆虫蚊蝇，减少疾病的病原体传播。加强饲养管理 选址和布局 合理的设计和布局对促进鸭子生长、减少应激反应及防止疾病起着重要的作用。养殖场应建在地势高燥、排水方便、水源充足、水质良好的上风上水处，养殖场应离公路干道、村镇居民区、企业工业区500米以上，并要具备三通(通电、通水、通路)，周围应筑围墙，有条件的在养殖场围墙外1米左右种植防护林。养殖区与饲料加工区、生活区必须严格分开，在大门口设车辆消毒池。鸭舍应配备有效的通风设备，以便送入新鲜空气，排出污浊气体，保持鸭舍干燥。鸭舍应当建成防鸟类和防啮齿类动物的模式，取暖和降温系统应能提供健康卫生的环境，以满足鸭子的生长。水源和饲料的选择 污染的水源对鸭子健康是有害的，应使用清洁无污染的饮用水源。营养均衡的饲料对促进鸭子生长起着重要的作用。劣质饲料除了导致营养缺乏外，还可使鸭子处于应激状态，更易病。尤其不能喂受潮或过期的饲料，因为受潮或过期的饲料黄曲霉素的含量可能超标。污染源的处理 病死的鸭子可能成为源。无论是死于疾病还是正常或淘汰的鸭子都应当进行无害化处理，防止疾病传播。目前，比较有效的处理方法是：焚烧或深埋，可以将垫料和粪便撒播地里或堆积发酵，发酵池应设在养殖场下风向30米处，发酵后的粪便作为种植业的有机肥料。

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册。是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。也是一家供应鸡苗，鸭苗，鹅苗，珍禽厂家，主营：麻鸡苗、三黄鸡苗、乌鸡苗、土鸡苗、珍珠鸡苗、高产绿壳蛋鸡、快大黄鸡苗等、全力打造系列禽苗优良品种。公司主营：清远麻鸡苗，土鸡苗，青脚土鸡苗，k9鸡苗，珍珠鸡苗等等。

规模的养殖鹅苗看技术操作规程 核心提示:鹅苗产业的快速发展，大规模看继续增加超过一万。但是鹅苗子和鸡的饲养管理技术，相关技术相比是一种鹅苗饲养管理

鹅苗产业的快速发展，大规模看继续增加超过一万。但是鹅苗子和鸡的饲养管理技术，而鹅苗饲养管理的相关技术还有待细化，并不断改善。我结合四年一大看的技术管理工作经验，主要从日常管理方面，提出了个人观点看的技术操作规程，与鹅苗养殖业的同事交流，一起讨论如何提高生产性能的看啦。

规模看需要良好的生产效益，必须想办法提高生产性能。种鹅苗繁育相关数据，主要数据指标:每批鹅苗子繁殖期(0到4周)，存活率超过99%，潜伏期(从25周5周)，高均匀度在84%以上，孵化率超过96%，产蛋期消除(26周)，但鹅苗妈妈率平均在70%以上。峰值超过85%的产卵率维持超过两个半月，鹅苗妈妈的速度在任何时候保持75%以上。受精率:干旱提高85~90%，水超过88~92%。为了使这种看生产性能达到上述标准，设置技术操作规程。仅供参考:

雏鹅苗、保证苦思冥想的时间，高存活率的关键措施:

1, 一个星期前的准备工作到年轻的(在正常祖DaiZhong看苗)

(1)在育幼室周围放置,把蜂巢大约两米的杂草和形式的垃圾。清理排水沟,育户外两米的范围内,喷洒10%漂白剂溶液或2%烧碱溶液,环境消毒。

(2)育室内,全2面改革硬件设备。如在线沉思:修复架有破损的,储水桶,饮用水管道,喷泉,包括自动和手动喷泉)检查损伤清洁,消毒备份。和保温系统维护:保温灯安装和调试、烟道加热是否正常,是否吸烟(及时修复,防止一氧化碳)。为维护门,窗户,主要检查是否密封保温。通风,照明灯是正常的操作。

(3)群内消毒,架,昆明鸡苗厂家批发,地面,墙壁(1.4米)全2面喷洒消毒剂:10%的漂白粉或2%烧碱溶液,八个小时后,用水清洗。40毫升(剂量每立方米,甲醛、20克高锰酸钾,15毫升热水。)熏蒸,密封的24小时。通风3-4天,然后到年轻的同一天,毒药的解决方案,全2面的喷雾消毒。

(4)天鹅苗:雏鹅苗材料运到育鱼饲料。常用:电解多维、盐、疫苗记录,加热煤、木炭就可以使用了。技术人员发展计划批次的窝:(根据苗族,数量确定饲养密度,每个小酒吧放太多,只有计划母巢之天,每日温度和湿度要求,照明时间和库存计划每一天,和育人员值班安排,等等)。在冬天,热预热提天。

(5)的雏鹅苗的到来前8小时窝室内温度32摄氏度,实现和维护稳定。人工喷泉,托盘,要完成所有的清洁和卫生。雏鹅苗、喷泉的到来前两小时应该加有来缓解压力(如:水根据额外剂量的盐、葡萄糖,或电解多维)的水。并放置在每一个小酒吧,停留三天。要求:每40雏鹅苗、喷泉供水。

2、年轻人和沉思的要点

(1)存在的雏鹅苗,计划在小篮子分布式预期列前,每个小酒吧一般把200更合适。重要的是要注意,留出的公鹅苗。(但雄鹅苗年代5%的鹅苗妈妈诱导鹅苗妈妈,可以防止德雷克同性恋,对后受精率有好处。)后次统计的总数篮子,一个接一个篮子再仔细数鹅苗子的数量,记录在运输的过程中,压力,许多鹅苗子和小鸡的。让鹅苗子自由提前良药的喝水。饲养员应该多注意观察,不要让鹅苗子抢水造成的。会有个人不会水鹅苗,鹅苗嘴碰水,诱导其饮水,饮水2小时后,起始原料在托盘雏鹅苗断食材料。4天前的自由收集食物,每次少量,经常添加,潘在任何时候材料。5天开始使用个人饲养品种的标准作为参考,结合环境因素,如确定进食能力,自母巢之根据的鹅苗标准体重控制体重增加,改善潜伏期均匀度和存活率,饲料,降低生产成本节约。

(3)通过人工喷泉和喝水的头三天,每次用水,消毒剂清洁的饮用水,和水。第四天之后自动饮水器喂水了,还想洗饮水机每天一次。原材料,也要每天洗一次,喂材料托盘颠倒后,为了防止鹅苗子脏盘子。窝内每三天(可以选择刺激性小的消毒1),一只鹅苗子喷雾消毒,育环境消毒外一周一次。

(4)加强日常管理:育人员要有高度的责任感,有经验的增殖育是1好的。随时观察温度计,以确保一个恒定的温度。三天前(合适的温度雏鹅苗的增长和发展尤为重要)小鹅苗挤堆,想马上离开,防止破碎。在北方的冬天,窝1好是一天24小时有人值班,保持一只鹅苗子堆破碎,老鼠吃了小鹅苗子。育鱼头和增殖,更加谨慎的观察雏鹅苗饮用水、采食量,精神状态,呼吸没有例外:(打喷嚏,张口呼吸,等等)和大便的颜色,是正常的。有异常情况立即报告现场技术人员,立即采取相应的措施。根据计划疫苗接种,或注射天腹腔镜,通常连接到一个饲料抗应激了两天。对于某些类型的畸形,禁用鹅苗早期。

防治措施

预防本病要做到幼鸡和成鸡分开饲养，鸡和火鸡不能混养，雏鸡如能进行网上饲养，使其不接触粪便和污物，可大大减少本病的发生。定期驱除鸡群异刺线虫，发现病鸡要及时隔离，鸡舍地面及运动场所要消毒。

(1) 抗蠕敏按每千克体重30毫克，一次性拌料饲喂，并在饲料中按0.04%的比例加入痢特灵，连用1周。

(2) 单独使用痢特灵。在饲料中添加0.04%，即每千克饲料中加4片（每片0.1克），连用5—7天。或按每千克体重250毫克混于饲料中内服，连用3天，停药3日，本地鸡苗厂家批发，再进行下一个疗程，连用3个疗程。

(3) 在饲料中添加0.05% -0.1%的2—氨基—5—硝基喹唑，每天1次，连用14天，有很好的疗1效。

(4) 用4—硝基benkun酸按每千克体重400 - 700毫克拌料。

(5) 用甲硝哒唑（灭滴灵）按每千克体重400毫克混入饲料，连用5—7天。

(6) 在病鸡转向康复时，用左旋咪唑驱除异刺线虫，按每千克体重25毫克（1片）一次性经口投服；也可使用针1剂，常用5%的注1注射液，按每千克体重肌肉注射0.5毫升。

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册。是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。也是一家供应鸡苗，绿壳蛋鸡苗厂家批发，鸭苗，鹅苗，珍禽厂家，主营：麻鸡苗、三黄鸡苗、乌鸡苗、土鸡苗、珍珠鸡苗、高产绿壳蛋鸡、快大黄鸡苗等、全力打造系列禽苗优良品种。公司主营：快大1麻鸡苗，三黄鸡苗，黄花鸡苗，清远麻鸡苗，土鸡苗等等。

鸡苗鸡痘病的明显症状及防治方法

鸡痘的病原为禽痘病毒，是一种比较大的痘病毒，从皮肤病灶脱落下来的干痘痂，它的毒力可以保存几个月之久，今天豫通鸡苗的小编就来大家讲讲鸡痘病的明显症状及防治方法。

临床症状 发病鸡精神沉郁，采食量下降，腿、脚、翅内侧、鸡冠、肉髯等部位长有硬的结节，内含黄脂状糊块，有的产生大块厚痂，随着病程进展，痂皮干燥脱落。有的鸡病初出现呼吸道症状，呼吸困难。

1、病理变化

在口腔、咽喉等处黏膜有圆形黄点，逐渐扩散为大片的呈灰白色干酪样假膜，后变成棕色痂块，凹凸不平，且有裂缝。痂块不易剥离，强行撕脱出现。

2、防治

(1) 本病无特效治疗药，所以一旦发现鸡痘，要加强管理，改善饲养条件，用含碘的消毒液带鸡对鸡舍进行消毒，每天一次，连续一周，病鸡与健康鸡隔离。

(2) 皮肤上的结痂，用镊子小心剥去，涂以碘或用碘酒、酒精消毒后涂红软膏。

(3) 用克毒一号、瘟毒清控制，同时预防继发。或全群加入痘克拌料，病毒灵饮水。

(4) 抽取生过鸡痘已治愈的鸡身上的血注入病鸡体内，可很快治愈。为了防止鸡病的发生，可同时添加硫磺新、庆大等。

(5) 由于蚊蝇与野鸟皆是本病的传播者，所以要作好杀灭蚊蝇与防鸟等工作。

怎么使用你的慧眼调查鹅苗的疾病

关于专门供应鹅苗的厂家孵化厂来说，这儿关于养鹅的敬仰是十分丰富的，可以在时间上从外观调查就可以得到鹅的病情，关于刚刚触摸鹅的饲养户来说将怎么观察鹅的疫病呢？就请看看下面的讲述。

鹅苗茸毛成长推迟 见于叶酸、泛酸、生物素、锌、硒等的缺少。

鹅苗茸毛稀疏或脱色 见于叶酸缺少症；也可见于泛酸缺少症、维生素D缺少症

鹅苗茸毛疏松、逆立 见于热性流行症引起的高热、寒战，如新城疫、性法氏囊病等。

鹅苗茸毛其实是家禽批发所特有的衍生物，一起刚出壳的雏禽体表覆盖着均匀纤细的绒毛；成年健康家禽茸毛十分的紧凑、平坦、润滑一起十分的赋有者光泽。

鹅苗茸毛疏松、污秽、无光泽见于、缓慢禽、蛔虫病、大肠杆菌菌、绦虫病、吸虫病、维生素B1缺少症、维生素A缺少症等。

鹅苗茸毛变脆、断裂、掉落 见于家禽啄癖、外寄生虫病、锌缺少症、生物素缺少症等。也可见于家禽自身啄羽，笼养鹅颈部茸毛掉落是与鹅笼冲突的成果。

鹅苗羽轴的边际弯曲，且有小结节构成 见于锌缺少症、维生素B2缺少症或某些病毒的。

鹅苗羽虱。查看时用逆翻头部、翅下及腹下的茸毛，可见到淡黄色或灰白色针尖巨细的羽虱在茸毛、绒毛或肌肤上爬动。纯种家禽长出异色茸毛 见于家禽的遗传性变异、一些营养素（如铁、铜、叶酸、维生素D等）的缺少等。

在饲养过程中，除了要搞好工作流程，做好防疫防治以外，还要学会注意调查鹅的活动量及外观的变化，不断提高饲养的技术水平。

绿壳蛋鸡苗厂家批发-惠民禽业(在线咨询)-昆明鸡苗厂家批发由广州惠民禽业有限公司提供。广州惠民

禽业有限公司在禽类这一领域倾注了诸多的热忱和热情，惠民禽业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。