

本地土鸡苗批发 惠民禽业 重庆土鸡苗批发

产品名称	本地土鸡苗批发 惠民禽业 重庆土鸡苗批发
公司名称	广州惠民禽业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区竹料大道东29号之二105-106
联系电话	13570938602 13570938602

产品详情

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册。是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。也是一家供应鸡苗，鸭苗，鹅苗，珍禽厂家，主营：麻鸡苗、三黄鸡苗、乌鸡苗、土鸡苗、珍珠鸡苗、高产绿壳蛋鸡、快大黄鸡苗等、全力打造出系列禽苗优良品种。公司主营：绿头野鸭苗，鹅苗，马岗鹅苗，竹丝鸡苗，火鸡苗等等。

鸡苗痛1风症的症状及诊治方法

一、病因 引发鸡痛1风症的原因很多，其中主要的原因是由于尿酸盐在体内广泛沉积所致。造成尿酸盐沉积的常见原因有四种：日粮中蛋白质比例过高，经脱氨后形成的尿酸盐过高，超过了1脏的排泄能力；由于磺1胺类用量过大或高钙低磷对肝功能造成损害；因呼吸道病、新城疫等疾病损害1脏，使尿酸盐排泄受阻，引起尿酸盐沉积；因鸡舍通风不良，氨气浓度过高，损害了鸡体的呼吸与排泄系统功能，致使尿酸盐在体内沉积。二、临床症状 1.内脏型痛1风症。病鸡精神不振，食欲减退、消瘦，贫1血，被毛蓬乱，土鸡苗批发多少钱，鸡冠苍白，腹泻，拉白色石灰样稀粪，松弛、粪便失禁，发病3~5日后常因衰竭而，鸡冠呈紫黑色。 2. 关节型痛1风症。由于尿酸盐在关节囊内沉积，病程较长，初期病鸡精神萎靡，采食量减少，行走不稳，本地土鸡苗批发，活动困难，有明显的跛行；各关节肿大，有些脚掌趾关节肿胀变形；采食停止，机体消瘦，瘫痪，不能站立，一般1周左右。三、诊断和防治 根据临床症状和剖检症状基本能够确诊该病。

养鸭业的生物安全和疾病预防

养鸭业是我国的特色产业和农村经济发展的支柱产业之一，目前我国鸭的饲养量占全世界的60%以上。中国幅员辽阔，有众多的江、河、湖泊、滩涂水面，三黄土鸡苗批发，适宜养鸭产业的发展。要促进我国由传统养鸭业向现代养鸭业跨越发展，必须牢牢把握生物安全和疾病防治这一关。生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护鸭群免遭致病微生物的侵袭，建立一道屏障，避免病原体扩散到健康鸭群

。在现今的规模化、集约化养殖模式下，鸭群始终受到致病微生物的威胁，生物安全的好坏是现今养鸭业能否成功和获利的关键。生物安全是通过减少环境中性微生物的数量来预防控制疫病，是一项省时、省力、省钱的预防措施。

控制源人员的控制 大多数疫病可通过人进行传播，包括参观者、邻近养鸭户、鸭场内部的工人、服务人员，以及参与接种、鸭子和饲料销售员等，进入鸭场的人员都必须进行消毒。平时鸭舍的门应当上锁，未经许可者不得入内。车辆和设备的控制 鸭场的大门出入口应设车辆消毒池，所有进入鸭场的车辆包括送种车、服务车、运送鸭子的车辆都必须进行消毒，特别是车辆轮胎、底盘和车厢外部均要消毒。所有送进鸭场的设备均要消毒。如有尘土、粪便或其他一些有机物质存在的情况下，首先要将所有消毒的物体表面用水清洗干净，然后按消毒1毒剂的使用说明进行喷洒消毒。动物和昆虫的控制 养鸭场禁止饲养食用动物、啮齿类动物和鸟类动物，因为它们可能成为疾病的生物和机械携带者，可传播像沙门氏菌和巴氏杆菌这样的病原菌。如马立克氏病病毒和禽痘病毒可通过蚊蝇和其他昆虫传播。因此，有效的粪便处理和死禽处理将有助于减少昆虫蚊蝇的数量。应当定期喷洒允许使用的杀1虫剂来控制昆虫蚊蝇，减少疾病的病原体传播。加强饲养管理 选址和布局 合理的设计和布局对促进鸭子生长、减少应激反应及防止疾病起着重要的作用。养殖场应建在地势高燥、排水方便、水源充足、水质良好的上风上水处，养殖场应离公路干道、村镇居民区、企业工业区500米以上，并要具备三通(通电、通水、通路)，周围应筑围墙，有条件的在养殖场围墙外1米左右种植防护林。养殖区与饲料加工区、生活区必须严格分开，在大门口设车辆消毒池。鸭舍应配备有效的通风设备，以便送入新鲜空气，排出污浊气体，保持鸭舍干燥。鸭舍应当建成防鸟类和防啮齿类动物的模式，取暖和降温系统应能提供健康卫生的环境，以满足鸭子的生长。水源和饲料的选择 污染的水源对鸭子健康是有害的，应使用清洁无污染的饮用水源。营养均衡的饲料对促进鸭子生长起着重要的作用。劣质饲料除了导致营养缺乏外，还可使鸭子处于应激状态，更易病。尤其不能喂受潮或过期的饲料，因为受潮或过期的饲料黄曲霉素的含量可能超标。污染源的处理 病死的鸭子可能成为源。无论是死于疾病还是正常或淘汰的鸭子都应当进行无害化处理，防止疾病传播。目前，比较有效的处理方法是：焚烧或深埋，可以将垫料和粪便撒播地里或堆积发酵，发酵池应设在养殖场下风向30米处，发酵后的粪便作为种植业的有机肥料。

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册。是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。也是一家供应鸡苗，鸭苗，鹅苗，珍禽厂家，主营：麻鸡苗、三黄鸡苗、乌鸡苗、土鸡苗、珍珠鸡苗、高产绿壳蛋鸡、快大黄鸡苗等、全力打造系列禽苗优良品种。公司主营：绿头野鸭苗，鹅苗，马岗鹅苗，竹丝鸡苗，火鸡苗等等。

蛋鸡产蛋量下降是何原因

蛋鸡产蛋量下降一、休产因素 即蛋鸡休产甘同期化如果有5%，~10%的鸡同时休产，产蛋量就会突然下降：这不是鸡群健康状况或产蛋潜力有什么变化，而是休产日同期化的鸡数临时增多，形成产蛋率下降假象：在很短的时间内，鸡群产蛋就会恢复原有水平。二、环境因素 1. 光照突然发生变化如果光照强度减弱、时间缩短，就会引起蛋鸡产蛋量突然下降二因此，鸡舍内要保持光照强度和光照时间相对稳定 如果要缩短光照时间和减弱光照强度，则需逐渐过渡，使鸡群有个适应过程。 2. 受寒流或热浪侵袭。遭受寒流或热浪侵袭，蛋鸡产蛋量会突然下降。因此，冬季出入鸡舍要及时关门，窗户要钉上塑料薄膜；夏季要遮阴，防止阳光直射鸡体，要注意做好预防工作。三、管理因素 1. 饲料问题。连续几天喂料不足或日粮成分和质量发生显著变化，蛋鸡产蛋量就会突然下降。因此，饲喂产蛋鸡要用全价配合饲料，且量要足，切忌饲喂发霉变质的饲料。

2. 饮水不足：缺水会导致产蛋停止。因此，要保持水槽中正常有水，且水质清洁无异味。 3. 外界刺激。异常声响、陌生人畜出现，会使鸡群突然受惊，造成产蛋量显著下降，因此，应尽量减少自然界对鸡群的不良刺激：或驱虫所引起的副1作用。也可使蛋鸡产蛋量突然下降：因此，要选用合理的和驱虫方法，定期进行预防接种和驱虫。

养鹅在饲喂青绿饲料时注意事项

鹅为草食家禽，饲养鹅一般采用以青绿饲料为主，适当搭配精料的方法。在饲喂青绿饲料时，应注意以下六点：

- 1、青绿饲料要现采现喂，不可长时间堆放，以防堆积过久产生亚硝酸盐，鹅食后易发生亚硝酸盐中毒。
- 2、青绿饲料采回后，要用清水洗净泥沙，切短饲喂。如果鹅长期吃含泥沙的青绿饲料，可引发胃肠炎。
- 3、不要去刚喷过农药的菜地、草地采食青菜或牧草，以防农药。一般喷过农药后需经15天后方可采集。
- 4、含草酸多的青菜不可多喂。如菠菜、甜菜等。因草酸和日粮中添加的钙结合后形成不溶于水的草酸钙，不能被鹅消化吸收，长时间大量饲喂青绿饲料，可引起鹅患佝偻病或瘫痪、母鹅产薄壳蛋或软蛋。
- 5、某些含皂素多的豆科牧草喂量不可过多，因为皂素过多能抑制雏鹅生长。有些苜蓿品种中皂素含量高达20%，因此，不能以青苜蓿作为的青绿饲料。
- 6、饲喂青绿饲料要多样化，这样不但可增加适口性，提高鹅的采食量，而且能提供丰富的植物蛋白和多种维生素。

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册。是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。也是一家供应鸡苗，鸭苗，鹅苗，珍禽厂家，主营：麻鸡苗、三黄鸡苗、乌鸡苗、土鸡苗、珍珠鸡苗、高产绿壳蛋鸡、快大黄鸡苗等、全力打造系列禽苗优良品种。公司主营：黄麻鸡苗，贵妃鸡苗，黑鸡苗，鸭苗，蛋鸭苗等等。

提高土鸡苗成活率的办法

从上世纪80年代起，我国养禽行业便逐步进入集约化养殖时期，但至今为止，广大农村中仍存在较多的养禽散养户，规模化养殖场较少。农村散养户一般养殖量较少，几十只到几千只鸡不等，多者达1万只，但也没成型的养殖模式。同时，鉴于养殖户养殖知识的不足、养殖条件的限制、市场疫情信息来源匮乏等，造成目前农村散养鸡的成活率普遍低下，饲养周期长，耗料多，见效慢，收入少，重者鸡只全部，经济损失尤为严重。此种情况主要原因分析如下：

很多农村散养户的鸡舍简陋、管理粗放、卫生差、消毒不严或根本无消毒措施，受外界影响大，致使大肠杆菌、巴氏杆菌、支原体等病原大量滋生传播致病，加大治疗难度。基础设施上如鸡只运动场地周围无护栏，造成鸡只到周边地区随便饮用污水或饮用附近菜场洒农药的水，造成全部死亡；无良好的保温设备，冬季气温骤降时，很多鸡只发生感冒，并引发其他疾病，造成鸡只死亡。很多散养户养鸡都是短期的，市场行情一片大好时，过年过节就要来临时，在鸡舍没消毒好，保温设备也欠佳，工作也没安排好时，便急急忙忙引进鸡苗，往往造成鸡苗进舍后没能及早开饮开食，也未能得到良好的保温，造成鸡只饿死或冷死。

用药不合理，盲目用药、乱用药或不用药。如用药不及时，延误病情；用药过量，引起；使用不当，很多养户把某种药当成“万应药”，一旦发病使用该药，致使鸡只使用此药过多，引发营养代谢病，产生抗药性与耐药性等等。另外，目前市面上假药及不合格药品众多，养户难以分辨真假，也是造成死鸡及养鸡成本的原因。

饲养管理不善，不注重营养和应激因素。如发病、炎热季节或大病初愈时，家禽食欲下降，饮欲有时增加，新陈代谢旺盛，抵抗力低下，营养不能满足机体正常需要，若此时未能及时补充营养，则会造成鸡只生长缓慢，增加。

鹅苗生产性能的因素很多

一、均匀度与开产日龄的关系 体成熟与性成熟呈正相关，性成熟延迟，鹅苗不能按预定时间进入产蛋期。如果鹅苗体均匀反差，体重轻的母鹅苗在应该达到开产日龄时，许多生理阈值都达不到，使性成熟和开产日龄受到影响，均匀度越高，开产日龄及达到5%产蛋率的周龄与标准越接近。

二、均匀度与产蛋高峰期的关系 均匀度高的鹅苗，开产后产蛋率增加较快，大约在未开后8周达到产蛋高峰，而且维持时间长，以后随着产蛋月龄的增长而缓下降，在整个产蛋期系峰突出，重庆土鸡苗批发，因而其产蛋曲线呈严格的偏态分布。均匀度差的鹅苗，其产蛋高峰往往在开产后9~10周才出现，同时，由于性成熟不一致，而导致群体中产生不同的个体生产模式。群体中个体鹅苗只生产模式的高峰不能相互发生重叠，所以产蛋高峰不突出，而且维持时间短，其产蛋率曲线也较平统。均匀度好的鹅苗，它们的生产时间及产蛋量接近相同，在一个单位时间里(约8周左右)产蛋高峰相对集中，因而其产蛋曲线要比均匀度差的群体好。

本地土鸡苗批发-

惠民禽业(在线咨询)-重庆土鸡苗批发由广州惠民禽业有限公司提供。广州惠民禽业有限公司是广东广州禽类的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在惠民禽业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创惠民禽业更加美好的未来。