

越心草莓种苗多少钱一棵 乾纳瑞农业 上饶草莓种苗多少钱一棵

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 越心草莓种苗多少钱一棵 乾纳瑞农业 上饶草莓种苗多少钱一棵 |
| 公司名称 | 泰安市乾纳瑞农业科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村 |
| 联系电话 | 13505388845 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市乾纳瑞农业科技有限公司

当气温下降至0 以下时，草莓苗要做好防冻工作。

1、双重膜保温防冻。在大棚内增设内膜覆盖，内膜可用上年用过的旧棚膜，当气温下降到5 以下时必须采用双重保温措施。

2、棚内放置火炉加温。当气温下降到-3 以下时，可在大棚内放置火炉加温，火炉只数随大棚的大小而定，以保持棚内温度在0 以上为准，但一定要注意人身安全，加温时人必须离开大棚内，第二天揭膜也要从棚外开始掀膜，及时开棚换气。有条件的可采用红外线灯等加温设施进行升温。

3、棚内适当灌shui和喷施根外追肥。当强冷空气来临之前，棚内适当灌shui和喷施磷钾肥等增强植株抗寒能力，减轻冻害。

一般白天温度控制在25-28 之间，不要超过30度，晚上以7度为宜。山东草莓苗初花期保持25度，成花期掌握在23度。十二月下旬到一月底之间，棚温低于5度时，应在大棚内设小拱棚复扣膜，低温时应采用三层膜保温。棚内湿度开花前控制在80%以下，越心草莓种苗多少钱一棵，开花至果实膨大控制在60%为宜。为防止高温高湿发病，喷洒“新高脂膜”乳剂800倍液，隔10天左右一次，共2次。到翌年4月份，气温明显回升可拆除大棚两边的围膜，加大通风量，起到降温降湿作用，延长果实的采摘期。

草莓苗地土壤消毒技术

草莓苗园地土壤消毒处理是确保草莓增产增收的一项重要技术措施。七、八月份晴热高温天气是对草莓种植地（特别是连作地）进行土壤消毒有利时机。现根据我市实际情况，介绍几种土壤消毒方法，上饶草莓种苗多少钱一棵，供草莓种植户参考选用。

一、草莓苗利用太阳能高温进行土壤消毒法

操作技术：消毒前先清理田块，前作是水稻的田，水稻收割后，稻秆切碎还田。然后亩施入腐熟栏肥2000公斤或鸡粪500公斤再加饼肥100公斤、熟石灰50公斤，撒施田中，翻耕后，田间灌有一定的水层（距土块的一半）。然后用农膜密闭覆盖，利用伏天高温和有机肥分解产生的能量进行土壤消毒。农膜覆盖时间要求为20天左右以上，覆盖时间越长效果越佳。揭膜后田间水让土壤自然吸干，然后亩撒施复合肥50公斤和磷肥50公斤，作畦。

1.危害症状

以幼虫咬食叶片、花蕾、花及果实，初龄幼虫啃食叶片下表皮及叶肉，京郊小白草莓种苗多少钱一棵，仅留有透明斑的上表皮；4龄后咬食叶片，奶油草莓种苗多少钱一棵，仅留主脉。

发生规律

山东草莓喜温，抗寒力弱，发生适温度为28--32℃，相对湿度75%-85%，土壤含水量20%~30%。成虫昼伏夜出，飞翔力强，对光、糖醋液等有趋性。初孵幼虫在卵块附近昼夜取食叶肉，留下叶片表皮，俗称“开天窗”，2-3龄开始转移危害，也仅取食叶肉。4-6龄的取食量占全代的90%以上，将叶片取食成小孔或缺刻，严重时能吃光叶片，并危害幼嫩茎秆。有假死性及自相残杀现象。

3.防治方法

清除杂草，摘除卵块及幼虫扩散危害前的被害叶。结合防治其他害虫，采用杀虫灯或性诱剂或糖醋液诱杀。药剂防治：根据幼虫危害习性，防治适期应掌握在卵孵高峰至低龄幼虫分散前，选择在傍晚施药，均匀喷雾叶面及叶背。在卵孵高峰期可选用5%氟虫脲乳油2000-2500倍液，或5%氟吡啶乳油2000-2500倍液等喷雾；在低龄幼虫始盛期选用10%三氟甲吡醚乳油1000倍液，或40%du死蟀乳油1000倍液等，均匀喷雾叶片正反两面。

越心草莓种苗多少钱一棵-乾纳瑞农业-上饶草莓种苗多少钱一棵由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。泰安市乾纳瑞农业科技有限公司为客户提供“农业技术的研发,苗木种植,销售（不含种子）,水果批发,零售”等业务，公司拥有“乾纳瑞”等品牌，专注于农林牧渔项目合作等行业。，在山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。