

乾纳瑞农业科技 哈密草莓种苗2020年价格

产品名称	乾纳瑞农业科技 哈密草莓种苗2020年价格
公司名称	泰安市乾纳瑞农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13505388845

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市乾纳瑞农业科技有限公司

草莓苗在高温干旱时期的管理技术

草莓苗冬季盖膜能成倍地增加产量，减少果实损失和防止污染。膜分大棚盖膜、地膜。盖膜时间应掌握在日平均温度降到8℃左右时，开始盖膜。先盖大棚膜，后盖地膜。盖膜前先要除草、中耕、施肥，防治病虫害。(大棚制作与购膜型号)由于篇幅有限恕不介绍，有意者请与农科所联系。盖膜后，晚上棚内应保持温度8℃，白天20℃左右，晴天中午要掀膜，下午3点复膜。温度过高，花粉死亡，温度过低花粉活性不够，难以授粉。

栽植深浅是栽植秧苗成活的关键。不宜栽的过深，不要埋住苗心，以防引发烂苗；也不要栽的太浅，如果新茎外露，容易引起秧苗干枯，以“上不埋心，下不露根”为宜。

大棚草莓畸形果的成因与预防

草莓畸形果形成的主要原因是授粉不良，宁丰草莓种苗2020年价格，但其轻重程度与以下因素有关：

一、品种。品种本身育性不高，雄蕊发育不良，雌雄配子育性不一致，导致授粉不完全而产生畸形果。如达娜等品种，易出现雄蕊短、雌蕊长现象，花粉粒少而小，发芽力差，因而易发生畸形果。

二、访花昆虫。保护地内蜜蜂等访花昆虫少，或由于环境影响，花朵中花蜜的糖分含量低，不能吸引昆虫传粉，授粉不佳。

三、温、湿度。高温、低温或高湿都可引起畸形果。开花授粉期，温度过低花粉发育不良，温度过高可导致花托变黑，高湿则影响花药开裂，且易形成水滴冲刷柱头。

四、花期喷药。花期喷药能冲刷柱头，特别是当天开的花更严重，不但妨碍授粉，而且还会妨碍昆虫传播花粉，导致畸形果率提高。

目前，生产中预防草莓畸形果可采取以下措施：

一、选用相应品种。在丽红、春香、宝交早生、红衣等品种中，以宝交早生最好。授粉品种可选择花粉量丰富的春香等与主栽品种混栽。

二、棚内养蜂。保护地栽培的草莓花期早，哈密草莓种苗2020年价格，前期自然出现的访花昆虫少，因而最好在棚内放养蜜蜂。每标准棚5000只左右，可使授粉率达100%。放蜂时间为上午8~9时和下午3~4时。

三、控制温、湿度。开花坐果期应经常通风排湿、降温。白天温度一般保持在20~28℃，夜间保持在6~7℃，相对湿度控制在90%以下。采用无滴膜扣棚，防止水滴冲刷柱头。

四、疏花、蔬果。疏除次花和畸形小果，可明显降低畸形果率，且有利于集中养分，提高单果重或果实品质。

五、减少用药。采用无病毒苗，地膜覆盖等农业措施，尽量不用药或减少用药。病虫严重时应在花前或花后用药，开花期严禁喷药，必要时可将蜂箱搬出用烟剂处理。

草莓苗根部发黑后死苗应如何防治

这种是疫霉菌侵染引起的根腐病，草莓苗使其根部先端及其上部变黑褐色，皮层不健全，中心柱红褐色，使植株地上黄化，圣诞红草莓种苗2020年价格，萎缩，甚至枯死。一般在连作地，地势低，灌水太多，会极易发生。药剂防治对症下药，该病应在发生初期，选用新高脂膜400倍液、58%甲霜灵锰锌或杀毒凡600倍液，妙香七号草莓种苗2020年价格，再用护树大将军灌根，消毒杀菌。间隔7~10天一次，病情严重时可五天一次，连用3~4次。另外，草莓苗植株根部还有可能发生黄萎病和凋萎病，以及苗植时有沤根现象，应分别对症防治措施才能有效。

乾纳瑞农业科技-哈密草莓种苗2020年价格由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。“农业技术的研发,苗木种植,销售(不含种子),水果批发,零售”选择泰安市乾纳瑞农业科技有限公司,公司位于:山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村,多年来,乾纳瑞农业坚持为客户提供好的服务,联系人:潘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。乾纳瑞农业期待成为您的长期合作伙伴!