

瑞香红苹果苗基地.嫁接苹果苗基地

产品名称	瑞香红苹果苗基地.嫁接苹果苗基地
公司名称	泰安万泽苗木有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安高新区北集坡街道办事处季家庄村519号（注册地址）
联系电话	18264870002

产品详情

瑞普丽苹果原美国品种，6月上旬成熟，成熟极早，果重210-300g，果型圆锥形。果面全红光洁，果肉黄白色，多汁、无渣，脆甜爽口，含糖量13%，含酸0.75%，品种上乘。耐运储，果实常温储存30天左右。树体自花结实，抗性强，不裂果、不落果、高产。维纳斯黄金以其华贵的外表，浓郁清新的口味迅速赢得消费者的喜爱。维纳斯黄金苹果果实长圆形，外观匀称周正，果形指数高。果肉多淡黄色，果肉口感脆爽。果实硬度较大。果汁丰，可溶性固形物极高，酸味轻、甜味足，果实有浓郁清新的芳香味，口感好、品质高。秦冠苹果是苹果的一个杂交品种。1957年，以丰产优质的金冠作母本，以结果早、极丰产、抗性强的鸡冠作父本进行有性杂交，杂交种子1000多粒，第二年春季营养钵育苗，三年生定植时进行选株，编号11—55。也就是说，“红颜”草莓，又名红颊，是以“章姬”*“幸香”杂交选育而成的优质早熟草莓品种，目前红颜草莓种植技术相对成熟，已经在我国经过多年试验、种植示范及大面积推广，是我国温室草莓主栽品种之一。下面来聊一聊红颜草莓高产栽培技术!红颜草莓种植技术管理要点定植技术红颜草莓属于大株型品种，培育壮苗标准为：有5片以上展开叶，根颈粗.8-1.cm，8cm以上根须1条以上，植株矮壮、根系发达、无病虫害的健壮脱毒良种苗。秦冠苹果植株结果早，丰产性能好，嫁接2-3年即可开花结果。果实10月中下旬成熟，果实大，短圆锥形，颜色深红，在一般室内条件下可贮藏到来年3-4月。适时摘收后需要经过后熟，风味方能充分显示出来。秦冠苹果适应性广，树势生长旺盛，抗病能力强，山、滩、坡地，寒、暖地均可生长，但以气候干燥、冷凉，日照充足和昼夜温差大的西北黄土高原最为理想。瑞阳苹果为优质、丰产、晚熟、红色品种，由“秦冠”和“富士”做亲本杂交选育，综合了“秦冠”和“富士”的诸多优良性状。其果实圆锥形，果个大，果面洁净，易着色，色泽艳丽；果肉细腻，香甜可口，品质优良；丰产性强，可连年高产、稳产，易管理，可免套袋栽培，适宜于规模化种植。在黄土高原高海拔地区表现尤为突出。“瑞雪”苹果为优质、晚熟、黄色品种，由“秦富1号”和“粉红女士”做亲本杂交选育。该品种特色明显，果实肉质细腻，酸甜适口，风味浓郁，具独特香气，品质；果形端正高桩，果面光洁，外观美；成熟期晚，极耐贮藏；树体具短枝特性，丰产性强，适应性广，在我国苹果主产区均可推广栽培。

蜜脆苹果花期长，授粉效果好，果形正，偏果极少，果实属大型果，盛果期树果实横径都能达到80毫米以上，商品率高。平均单果质量320克，果实色泽艳丽，果面着鲜红色条纹，易着色，成熟后全红。风味独特，果肉细密，质地脆而不硬，汁多味厚，甜酸适口，有香味，含糖量高，口感特好。华硕苹果，苹果早熟品种除了比较老的品种嘎啦，美八，等现在表现比较好的就属华硕跟鲁丽了。嘎啦成熟期早，果树后期出现早期落叶病，果实还没完全成熟叶子已经落光，这对于当年的果实品质和次年的产量及品质有极大的影响，且目前没有好的办法。美八苹果，成熟期比嘎啦晚，颜色个头都可以，不好的就

是果实不容易放，容易发面。华硕，早熟品种，果个大，单果300克以上，大果可达500克，果实在内陆地区的苹果次生区表现上色不全，有红晕，果实口感可以，一般均果售价5到7元 也就是说，一般春夏二季各施一次饼肥水即可。盆栽时，须在冬季施些薄肥，其他季节不宜施肥。立冬后，应移放室内养护，寒冬季节室内温度不能低于 ，否则容易枯死。施肥宜少。除基肥外，一般在夏初或秋末施1次稀薄的腐熟液肥即可。肥水过多，容易引起徒长而使树形难以控制。六月雪养殖的浇水方法六月雪适应能力强，排水性很好，浇水不宜过多，但应保持盆土湿润，盆土排水要流畅，否则会生长过旺影响整体美感。六月雪喜湿润，一般春秋每天浇水1次，夏季每天浇水2次，但浇水也不可过多，如果盆土积水容易烂根。寒富由沈阳农业大学园艺系用东光和富士杂交育成果实短圆柱形,平均单果重230克,果面底色黄绿色,或片状鲜红色。果肉淡黄色,肉质酥脆,多汁,甜味浓,有香气,含可溶性固形物15.2%,品质极上等。耐贮性极强,在一般土窖内贮藏10个月后,不皱皮、不变质。幼树生长势较强,具有短枝型性状。栽后3年开始结果,果实在沈阳地区于10月初成熟。抗蚜虫、红蜘蛛和早期落叶病。对土壤和气候适应性强,适宜辽宁内蒙古及西北寒冷地区栽培。然而并非如此，一斫中7-8月危害最重，9月虫口密度，1月下旬后陆续越冬。成虫喜在中午活动，每头雌成虫的产卵量因寄主不同而异，可由数十粒至上百粒，卵分次产，常数粒至数十粒相邻，产卵处外面都有1个稍为凹陷的小黑点。方法：冬季清除盆花、盆景园内周围的落叶、杂草。对茎干较粗并较粗糙的植株，涂刷白涂剂。在越冬成虫出蛰活动到代若虫开始孵化的阶段，是药剂的最有利时机。可喷5%杀螟松1倍液，或4%氧化乐果1-15倍液，或1-2%拟除虫菊酯类1-2倍液，每隔1-15天喷施1次，连续喷施2-3次。