

高桩苹果苗种植技术.矮化苹果苗优点

产品名称	高桩苹果苗种植技术.矮化苹果苗优点
公司名称	泰安万泽苗木有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安高新区北集坡街道办事处季家庄村519号（注册地址）
联系电话	18264870002

产品详情

瑞普丽苹果原美国品种，6月上旬成熟，成熟极早，果重210-300g，果型圆锥形。果面全红光洁，果肉黄白色，多汁、无渣，脆甜爽口，含糖量13%，含酸0.75%，品种上乘。耐运储，果实常温储存30天左右。树体自花结实，抗性强，不裂果、不落果、高产。维纳斯黄金以其华贵的外表，浓郁清新的口味迅速赢得消费者的喜爱。维纳斯黄金苹果果实长圆形，外观匀称周正，果形指数高。果肉多淡黄色，果肉口感脆爽。果实硬度较大。果汁丰，可溶性固形物极高，酸味轻、甜味足，果实有浓郁清新的芳香味，口感好、品质高。秦冠苹果是苹果的一个杂交品种。1957年，以丰产优质的金冠作母本，以结果早、极丰产、抗性强的鸡冠作父本进行有性杂交，杂交种子1000多粒，第二年春季营养钵育苗，三年生定植时进行选株，编号11—55。也就是说，施肥在保留的土壤中施入腐叶土、泥炭藓或腐熟的农家肥料等，以改良土壤的结构，提高其保水能力。修剪在大根被切断或损伤较严重的情况下，应对地上部分进行合理的、适度的修剪，以保持根系吸收与枝叶蒸腾水分相对的平衡。做土台对于古苗木和较珍贵的苗木，在挖方时应在其干基周围留有一定大小的土台，土台不能太小，如果太小，特别是在取土较深时，不但伤根太多，而且会限制根系生长发育。由于根系分布近苗木者浅，远离苗木者深，因此留的土台是内高外低，还可以修筑成台阶式。秦冠苹果植株结果早，丰产性能好，嫁接2-3年即可开花结果。果实10月中下旬成熟，果实大，短圆锥形，颜色深红，在一般室内条件下可贮藏到来年3-4月。适时摘收后需要经过后熟，风味方能充分显示出来。秦冠苹果适应性广，树势生长旺盛，抗病能力强，山、滩、坡地，寒、暖地均可生长，但以气候干燥、冷凉，日照充足和昼夜温差大的西北黄土高原最为理想。瑞阳苹果为优质、丰产、晚熟、红色品种，由“秦冠”和“富士”做亲本杂交选育，综合了“秦冠”和“富士”的诸多优良性状。其果实圆锥形，果个大，果面洁净，易着色，色泽艳丽；果肉细腻，香甜可口，品质优良；丰产性强，可连年高产、稳产，易管理，可免套袋栽培，适宜于规模化种植。在黄土高原高海拔地区表现尤为突出。“瑞雪”苹果为优质、晚熟、黄色品种，由“秦富1号”和“粉红女士”做亲本杂交选育。该品种特色明显，果实肉质细腻，酸甜适口，风味浓郁，具独特香气，品质；果形端正高桩，果面光洁，外观美；成熟期晚，极耐贮藏；树体具短枝特性，丰产性强，适应性广，在我国苹果主产区均可推广栽培。

蜜脆苹果花期长，授粉效果好，果形正，偏果极少，果实属大型果，盛果期树果实横径都能达到80毫米以上，商品率高。平均单果质量320克，果实色泽艳丽，果面着鲜红色条纹，易着色，成熟后全红。风味独特，果肉细密，质地脆而不硬，汁多味厚，甜酸适口，有香味，含糖量高，口感特好。华硕苹果，苹果早熟品种除了比较老的品种嘎啦，美八，等现在表现比较好的就属华硕跟鲁丽了。嘎啦成熟期早，果树后期出现早期落叶病，果实还没完全成熟叶子已经落光，这对于当年的果实品质和次年的产量

及品质有极大的影响，且目前没有好的办法。美八苹果，成熟期比嘎啦晚，颜色个头都可以，不好的就是果实不容易放，容易发面。华硕，早熟品种，果个大，单果300克以上，大果可达500克，果实在内陆地区的苹果次生区表现上色不全，有红晕，果实口感可以，一般均果售价5到7元 也就是说，丁香：可用小叶女贞作砧木，采用劈接、芽接法。劈接春季进行，芽接夏季进行。桂花：小叶女贞、大叶女贞、水腊树等都可作桂花的砧木，可采用切接或靠接的方法，在春夏季均能进行。扶桑：用紫花木槿作砧木，采用枝接法在春夏两季进行。樱花：可用山樱为砧木，用切接、芽接法。切接宜在春季，芽接宜在夏季进行。山茶（珍稀品种）：可用普通品种的山茶、油茶作砧木，采用切接法在早春进行。蟹爪兰：可用仙人杖、仙人掌等作砧木，采用平接或劈接法，在春、夏、秋季均可，如在室内冬季也可进行。寒富由沈阳农业大学园艺系用东光和富士杂交育成果实短圆柱形，平均单果重230克，果面底色黄绿色，或片状鲜红色。果肉淡黄色，肉质酥脆，多汁，甜味浓，有香气，含可溶性固形物15.2%，品质极上等。耐贮性极强，在一般土窖内贮藏10个月后，不皱皮、不变质。幼树生长势较强，具有短枝型性状。栽后3年开始结果，果实在沈阳地区于10月初成熟。抗蚜虫、红蜘蛛和早期落叶病。对土壤和气候适应性强，适宜辽宁内蒙古及西北寒冷地区栽培。然而并非如此，一般来说，可于4月至6月，每月浇一到两次透水，7月、8月为降水丰沛期，如不是过于干旱，可不浇水。至11月初浇一次透水即可。月初结合浇封冻水。翌年早春3月浇解冻水。大花溲疏的根系较浅，虽然其较耐旱，但充足的水分可使其枝繁叶茂，故生长期的浇水不可忽视。病虫害危害大花溲疏的害虫有朱砂叶螨和双斑虱。如有朱砂叶螨发生，可于危害期喷施1.8%爱福丁乳油3倍液进行杀灭，也可于早春发芽前喷施3—5波美度石硫合剂，消灭越冬螨体。