

矮化新品种苹果种植技术.矮化苹果苗优点

产品名称	矮化新品种苹果种植技术.矮化苹果苗优点
公司名称	泰安万泽苗木有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安高新区北集坡街道办事处季家庄村519号（注册地址）
联系电话	18264870002

产品详情

瑞普丽苹果原美国品种，6月上旬成熟，成熟极早，果重210-300g，果型圆锥形。果面全红光洁，果肉黄白色，多汁、无渣，脆甜爽口，含糖量13%，含酸0.75%，品种上乘。耐运储，果实常温储存30天左右。树体自花结实，抗性强，不裂果、不落果、高产。维纳斯黄金以其华贵的外表，浓郁清新的口味迅速赢得消费者的喜爱。维纳斯黄金苹果果实长圆形，外观匀称周正，果形指数高。果肉多淡黄色，果肉口感脆爽。果实硬度较大。果汁丰，可溶性固形物极高，酸味轻、甜味足，果实有浓郁清新的芳香味，口感好、品质高。秦冠苹果是苹果的一个杂交品种。1957年，以丰产优质的金冠作母本，以结果早、极丰产、抗性强的鸡冠作父本进行有性杂交，杂交种子1000多粒，第二年春季营养钵育苗，三年生定植时进行选株，编号11—55。也就是说，一股又一股的冷空气来来去去，宣告了冬季已经来临，北方地区很早就已经下雪。秋冬季是植物移栽的时节，新栽的绿化苗木根系扎得不深，耐寒力偏弱。采取有效的越冬管理措施对当年新栽小叶女贞能否安全越冬而言是一项很重要的工作。小叶女贞的寓意小叶女贞具有非常美好的寓意。小叶女贞造型树的寓意是吉祥如意。树叶四季常青，寓意青春永驻。小叶女贞造型是一层一层的到树梢，寓意步步高升。而且小叶女贞造型树对，氯化氢等毒气有较好的抗性，对空气质量有很好的改善，可以说是人们喜爱的树种。秦冠苹果植株结果早，丰产性能好，嫁接2-3年即可开花结果。果实10月中下旬成熟，果实大，短圆锥形，颜色深红，在一般室内条件下可贮藏到来年3-4月。适时摘收后需要经过后熟，风味方能充分显示出来。秦冠苹果适应性广，树势生长旺盛，抗病能力强，山、滩、坡地，寒、暖地均可生长，但以气候干燥、冷凉，日照充足和昼夜温差大的西北黄土高原最为理想。瑞阳苹果为优质、丰产、晚熟、红色品种，由“秦冠”和“富士”做亲本杂交选育，综合了“秦冠”和“富士”的诸多优良性状。其果实圆锥形，果个大，果面洁净，易着色，色泽艳丽；果肉细腻，香甜可口，品质优良；丰产性强，可连年高产、稳产，易管理，可免套袋栽培，适宜于规模化种植。在黄土高原高海拔地区表现尤为突出。“瑞雪”苹果为优质、晚熟、黄色品种，由“秦富1号”和“粉红女士”做亲本杂交选育。该品种特色明显，果实肉质细腻，酸甜适口，风味浓郁，具独特香气，品质；果形端正高桩，果面光洁，外观美；成熟期晚，极耐贮藏；树体具短枝特性，丰产性强，适应性广，在我国苹果主产区均可推广栽培。

蜜脆苹果花期长，授粉效果好，果形正，偏果极少，果实属大型果，盛果期树果实横径都能达到80毫米以上，商品率高。平均单果质量320克，果实色泽艳丽，果面着鲜红色条纹，易着色，成熟后全红。风味独特，果肉细密，质地脆而不硬，汁多味厚，甜酸适口，有香味，含糖量高，口感特好。华硕苹果，苹果早熟品种除了比较老的品种嘎啦，美八，等现在表现比较好的就属华硕跟鲁丽了。嘎啦成熟期早，果树后期出现早期落叶病，果实还没完全成熟叶子已经落光，这对于当年的果实品质和次年的产量

及品质有极大的影响，且目前没有好的办法。美八苹果，成熟期比嘎啦晚，颜色个头都可以，不好的就是果实不容易放，容易发面。华硕，早熟品种，果个大，单果300克以上，大果可达500克，果实在内陆地区的苹果次生区表现上色不全，有红晕，果实口感可以，一般均果售价5到7元 也就是说，一般使用浓度为50ppm-200ppm之间，每次间隔喷药时间为7-15天，喷药使用原则与方法也同于矮壮素，浓度在50ppm—200ppm时，使用最安全，也有很好的喷药矮化效果，且还可减少菊花病虫害的发生，使用成本也较低。以上三种的矮化效果都受气温高低的影响，高温季节药效高。随着气温的降低，要想达到高温时相同的药效，就必须逐渐加大药的浓度。使用矮化剂对菊花的生长发育还有某些副作用，如花期推迟等。

寒富由沈阳农业大学园艺系用东光和富士杂交育成果实短圆柱形,平均单果重230克,果面底色黄绿色,或片状鲜红色。果肉淡黄色,肉质酥脆,多汁,甜味浓,有香气,含可溶性固形物15.2%,品质极上等。耐贮性极强,在一般土窖内贮藏10个月后,不皱皮、不变质。幼树生长势较强,具有短枝型性状。栽后3年开始结果,果实在沈阳地区于10月初成熟。抗蚜虫、红蜘蛛和早期落叶病。对土壤和气候适应性强,适宜辽宁内蒙古及西北寒冷地区栽培。然而并非如此，一旦种子发出幼苗，立即除去遮阳网。当长出3-4片真叶时即行定植。

球根法：将海芋根部自然分生的小球挖出、分级，一般分为两级：2克以上为1级，2克以下为2级。播种前将地耕好、整平，做成宽1米、长2-3米的畦，以备播种。播种密度：1级种的行距为2厘米、株距8厘米；种可适当缩小行距。播种时，需在已做好的畦面上开沟定向播种。播种深度为4-5厘米，然后覆土耩平，浇水。浇水后，应及时喷洒除草剂。一般每亩用33%除草通乳油1-15毫升，对水6-75千克，用喷雾器均匀喷洒在畦面上。