

安顺普定县土鸡苗 青脚黄麻羽红公鸡苗散养土鸡包运输成活

产品名称	安顺普定县土鸡苗 青脚黄麻羽红公鸡苗散养土鸡包运输成活
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

广汉中力家禽养殖有限公司是一家以种养、孵化、销售为一体的公司。有多年的养殖技术经验，常年为各位新老客户提供技术服务，指导养殖户掌握基础知识，提高养殖水平。养殖的新手很多没有养殖经验，本公司可以给大家提供养殖方面的很多经验技术经验，共同发展。全年提供出壳鸡苗：土鸡苗、青脚麻鸡苗、九斤黄鸡苗、红瑶、黑瑶、K9、芦花鸡、黑乌鸡、白乌鸡、五黑鸡苗等。

雏鸡的饲养与管理 1、雏鸡的饲养：雏鸡开食前，先用4/万的高锰酸钾液饮水一次，用于消毒和排出胎粪，清理肠道。雏鸡开食即雏鸡一次吃食，用雏鸡颗粒饲料饲喂，开始每日喂5--6次，对于体质较弱的鸡，黑夜要加喂一次，以后逐渐改喂3--4次/日。雏鸡料的营养指标：粗蛋白18--19%；能量2900千卡/公斤；粗纤维3--5%；粗脂肪2.5%；钙1--1.1%；磷0.45%；蛋氨酸0.45%；赖氨酸1.05%。雏鸡的用料量应根据实际饲喂情况而掌握。雏鸡饲喂一定要做到定时、定量、定质，并要保持清洁饮水。2、育雏温度：温度的高低对雏鸡的生长发育有很大的影响，因此必须严格掌握育雏温度。育雏温度要掌握这样一个基本原则，育雏初期温度宜高，弱雏的育雏温度应稍高，小群饲养比大群饲养高，夜间比白天高，阴雨天比晴天高。在实际饲养过程中，如果温度适宜时，雏鸡分布均匀，活泼好动；温度过低时，雏鸡缩颈，互相挤压，层层堆叠，尖叫；温度过高时，雏鸡伸舌，张嘴喘气，饮水增加。3、育雏湿度：如果室内空气的湿度过低，雏鸡体内的水份会通过呼吸大量散发出去，同时易引起灰尘飞扬，使雏鸡易患呼吸道疾病；如果室内空气湿度过大，会使有害微生物大量繁殖，影响雏鸡的健康发展；因此，育雏室内的湿度应保持在65--70%。4、保持正常的通风：育雏舍内二氧化碳的含量应控制在0.2%，不应超过0.5%。氨气含量要求低于10ppm，不应超过20ppm，H₂S的含量要求在6.6ppm，不应超过15ppm。在通风换气时，要严防雏鸡感冒，要求做到在通风之前，先提高育雏室温，通风时间选择在中午前后，通风换气应缓慢进行。5、光照及饲养密度：1--3日令全天光照，4--5日令15--20小时/日；6--9日令16--18小时/日；10--14日令14--16小时/日；15--28日令12--14小时/日；28--42日令8--10小时/日。饲养密度：1--2周令30--40只/平方米，3--4周令25--30只/平方米，5--6周令20--25只/平方米。6、断喙：雏鸡断喙时间一般是7--10日令，为防止应激，在断喙前后天在饮水或饲料中加Vk₄(4mg/kg)或加电解多维。7、雏鸡免疫：为防止雏鸡各种传染病的发生，应根据种鸡场提供的鸡免疫程序，做好马立克、鸡新城疫、传染性法氏囊、传染性支、喉气管炎和鸡痘的免疫工作。