

抗性红蜘蛛专用药25%哒螨灵螺螨酯红蜘蛛药锈壁虱杀螨剂杀虫剂500g

产品名称	抗性红蜘蛛专用药25%哒螨灵螺螨酯红蜘蛛药锈壁虱杀螨剂杀虫剂500g
公司名称	无为县张玉农资经营部
价格	40.00/500g
规格参数	净含量::500g 农药登记证号:PD20183131 农药名称:哒螨·螺螨酯
公司地址	安徽省芜湖市无为县开城镇河西街道
联系电话	18855369397 18855369397

产品详情

本品满一瓶包邮

规格：500克*20瓶/箱

正规登记 三证可查 拒绝假冒

使用范围和使用方法：

作物/场所防治对象用药量（制剂量/亩）施用方式柑橘树红蜘蛛5000-6000倍液喷雾

使用技术要求:1、在红蜘蛛始盛期用药。施用时应使作物叶片正反面、果实表面以及树干、枝条等充分均匀着药。2、施药后，请立即使用。3、大风天或预计1小时内有雨，请勿施药。4、本品在柑橘树上的安全间隔期为30天，每季

产品性能:本品属具有触杀和胃毒作用的杀螨剂，对卵、若螨和成螨均有较好的防治效果。

注意事项：1、施药时应注意安全防护，配戴防护面罩,戴防毒口罩，穿操作服、防护胶靴、胶手套等防护用品，洗防护用具，洗澡，并更换和清洗工作服。

2、施药期间应避免对周围蜂群的影响、开花植物花期、蚕室和桑园附近禁用。远离水产养殖区、河塘等水体施

3、剩余药液要妥善保管，施药后要将器械清洗干净，不要污染水源。使用过的空包装，用清水冲洗三次后妥善

4、本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。 5、孕妇及哺乳期妇女避免接触本品。

中毒急救措施：使用中或使用后如感不适，应立即停止工作，采取急救措施，并携带标签就医。接触皮肤：脱

溅入：立即用流动清水冲洗不少于15分钟并就医。吸入：立即离开施药现场，转移至空气清新处并就医。误服

毒症状为主，引吐并给患者服用吐根糖浆，抢救时避免给患者使用增强 - 氨基丁酸活性的药物，如（巴比妥

储存和运输方法：本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离热源、火源或水源及居民区。置于儿童、无

饮料、粮食、种子、饲料等其他商品及其它易燃、易爆品同贮同运。
