

一公分苹果苗基地，三公分苹果苗

产品名称	一公分苹果苗基地，三公分苹果苗
公司名称	泰安万泽苗木有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安高新区北集坡街道办事处季家庄村519号（注册地址）
联系电话	18264870002

产品详情

常见的苹果苗品种有很多，如国光苹果苗，新国光苹果树苗，新乔纳金苹果，七月仙苹果苗，华美苹果苗，青香苹果苗，富士王苹果苗，岳金苹果苗，神富0苹果树苗，烟富3苹果树苗，烟富6苹果树苗，望香红苹果树苗等等很多，今天山东万泽苗木为您分享几个苹果新品种。麦露西：外形呈绿果，口感爽脆，甘甜，甜味不是纯甜。糖度13%-14%，有种浓郁的香味，烟台地区约7月10日成熟。河南地区大约是6月25号就接近成熟了。优势1、不用套袋。森林光辉苹果：属于中熟苹果苗，原日本品种，及水蜜桃苹果之前成熟，国内9月上中旬，果实黄皮黄肉，果面无锈斑，种植中果实需套袋，果实商品性高。果实均重量320克-370克。众成一号苹果苗：中大型高桩果，坐果至成熟需170天左右，山东，陕西，河北，河南等地约10月中下旬成熟。外观呈靓丽的鲜红色，属罕见的樱桃红。真正的全红果，从萼洼，果面到梗洼全部着色。摘袋4个晴天即可上全色，可一次性采收，省工省心。水蜜桃苹果是王林和富士杂交培育出的品种，虽不像王林那般带明显的果点，又不像富士那般鲜艳夺目；爱妃苹果苗：10月中下旬成熟，果个75~95毫米，大型果；近圆形；着红色或暗红色果肉致密。瑞普丽苹果原美国品种，6月上旬成熟，成熟极早，果重210-300g，果型圆锥形。果面全红光洁，果肉黄白色，多汁、无渣，脆甜爽口，含糖量13%，含酸0.75%，品种上乘。耐运储，果实常温储存30天左右。树体自花结实，抗性强，不裂果、不落果、高产。；维纳斯黄金以其华贵的外表，浓郁清新的口味迅速赢得消费者的喜爱。维纳斯黄金苹果果实长圆形，外观匀称周正，果形指数高。果肉多淡黄色，果肉口感脆爽。果实硬度较大。果汁丰，可溶性固形物极高，酸味轻、甜味足，果实有浓郁清新的芳香味，口感好、品质高。

秦冠苹果是苹果的一个杂交品种。1957年，以丰产优质的金冠作母本，以结果早、极丰产、抗性强的鸡冠作父本进行有性杂交，杂交种子1000多粒，第二年春季营养钵育苗，三年生定植时进行选株，编号11—55。[1]

秦冠苹果植株结果早，丰产性能好，嫁接2-3年即可开花结果。果实10月中下旬成熟，果实大，短圆锥形，颜色深红，在一般室内条件下可贮藏到来年3-4月。适时摘收后需要经过后熟，风味方能充分显示出来。秦冠苹果适应性广，树势生长旺盛，抗病能力强，山、滩、坡地，寒、暖地均可生长，但以气候干燥、冷凉，日照充足和昼夜温差大的西北黄土高原最为理想。

瑞阳苹果为优质、丰产、晚熟、红色品种，由“秦冠”和“富士”做亲本杂交选育，综合了“秦冠”和“富士”的诸多优良性状。其果实圆锥形，果个大，果面洁净，易着色，色泽艳丽；果肉细腻，香甜可口，品质优良；丰产性强，可连年高产、稳产，易管理，可免套袋栽培，适宜于规模化种植。在黄土高原高海拔地区表现尤为突出。“瑞雪”苹果为优质、晚熟、黄色品种，由“秦富1号”和“粉红女士”做亲本杂交选育。该品种特色明显，果实肉质细腻，酸甜适口，风味浓郁，具独特香气，品质；果形端正高桩，果面光洁，外观美；成熟期晚，极耐贮藏；树体具短枝特性，丰产性强，适应性广，在我国苹果主产区均可推广栽培。

11.蜜脆苹果花期长，授粉效果好，果形正，偏果极少，果实属大型果，盛果期树果实横径都能达到80毫米以上，商品率高。平均单果质量320克，果实色泽艳丽，果面着鲜红色条纹，易着色，成熟后全红。风味独特，果肉细密，质地脆而不硬，汁多味厚，甜酸适口，有香味，含糖量高，口感特好。然而并非如此，一般情况下，蚂蚁遇到纯净的水总会涉水爬过去，可是一旦长时间接触烟丝水，就会缩成一团死去。但是用这种方法杀死的都是工蚁，而蚁后依然会在巢中不断繁殖新蚂蚁。于是，我坚持不懈，每天都用半包烟泡成烟丝在盆花附近和一切蚂蚁可藏身之处喷洒。同时，把家中一切能做蚂蚁食饵的食物统统隐藏起来，约莫一个星期，蚂蚁终于被制服。盆土表面掺入少量石灰水，即可杀死全部蚂蚁。使用常见的橡皮筋。在窗台、花盆、墙缝中放几根橡皮筋，就可以起到驱逐蚂蚁的作用，因为橡皮筋是用橡胶与乳胶制成的，橡胶味道较重，可以长时间发挥效果。

12.华硕苹果，苹果早熟品种除了比较老的品种嘎啦，美八，等现在表现比较好的就属华硕跟鲁丽了。嘎啦成熟期早，果树后期出现早期落叶病，果实还没完全成熟叶子已经落光，这对于当年的果实品质和次年的产量及品质有极大的影响，且目前没有好的办法。美八苹果，成熟期比嘎啦晚，颜色个头都可以，不好的就是果实不容易放，容易发面。华硕，早熟品种，果个大，单果300克以上，大果可达500克，果实在内陆地区的苹果次生区表现上色不全，有红晕，果实口感可以，一般均果售价5到7元所以说，一般冬季3~5天浇1次，春、秋季可1~2天浇1次，夏季和开花期适当增加浇水次数。浇水时勿把水浇在叶片上以防叶子腐烂。若发现叶上有灰尘时，可用软布轻擦叶面，也可用软毛刷掸刷，不要大量淋水洗刷；肥料要求：君子兰喜肥，但肥料过多会造成烂根，除施底肥外，追肥宜采用“薄肥多施”的方法。可每隔2天左右，结合浇水施一次发酵的豆饼水、淡鱼腥水和马蹄水等，把浇水和施肥结合起来；光照要求：控制光的强度。在整个栽培过程中，尽量不让植株受日光直射，每天能有四小时左右在散射日光下就可以了，光照过强会使叶变窄，并非全部如此，香花槐幼苗要预防蝗虫或蚂蚱啃吃主干和嫩叶，用常用的杀虫剂来预防，如锌硫磷，氧化乐果喷雾等。进入夏季，注意香花槐苗尖和嫩叶部位的黑密虫，通常采用杀虫剂喷雾。如秋前后，香花槐根干部位易患腐烂病或线虫啃食，用杀虫剂兑防腐烂喷雾。苗期管理，注意掐侧心，一般侧心在长至3厘米前掐去，以免影响苗木生长。树苗长至6厘米左右时，要预防大风导致苗木倒伏，可采用插棍捆绑的方法来预防。施肥：苗木5厘米以上时施肥，用尿素或二氨，在雨前抛洒。一半来说，生长期内的浇水频度是休眠期（10月中旬至次年2月底）内的2倍，浇水量是3-4倍。在过渡期，浇水的节奏要随环境温度的变化而变化，但要知道从24度起几乎每天就得浇水1次。木本植物的浇水——在气温正常（室内气温18-20度）的条件下，树干坚硬或树根牢固以及叶片厚实的植物生长期每周浇水1次，在冬季（休眠期）每10天或15天浇水1次。人们习惯在土壤表面浇水。草本植物的浇水——无明显地上茎（无茎）呈莲座状的植物或茎细柔丛生以及草本的植物，在生长期每周浇水2次，冬季浇水1次。

13.寒富由沈阳农业大学园艺系用东光和富士杂交育成果实短圆柱形，平均单果重230克，果面底色黄绿色，或片状鲜红色。果肉淡黄色，肉质酥脆，多汁，甜味浓，有香气，含可溶性固形物15.2%，品质极上等。耐贮性极强，在一般土窖内贮藏10个月后，不皱皮、不变质。幼树生长势较强，具有短枝型性状。栽后3年开始结果，果实在沈阳地区于10月初成熟。抗蚜虫、红蜘蛛和早期落叶病。对土壤和气候适应性强，适宜辽宁内蒙古及西北寒冷地区栽培。所以说，万寿菊栽培要点移栽万寿菊幼苗移栽控制种植间距，可根据花苗大小确定栽植间距，缓苗期避免晒太阳，恢复长势后正常光照、浇水。温度万寿菊适宜生长温度2~3℃，夏季高度可喷水降温，冬季寒冷可采取保暖措施，露地养殖温不得高于35℃，温不得低于0℃。浇水万寿菊生长期喜水，少量多次，每次浇透水，避免土壤干旱勤浇水。万寿菊不同时期对水分需求不同，浇水根据季节变化改变，夏秋季适宜早上浇水，春季适合中午浇水，冬季控水可不浇或者少浇。很明显8月下旬老熟幼虫开始化蛹，蛹期6天左右。上旬可见成虫出现，成虫在原虫道内串食危害，并不外出迁移。在6月下旬至8月上旬成虫才外出活动，8月中下旬又进入蛀道内危害。月下旬至11月初成虫迁移到1至3cm粗的新枝条上危害。常从枝杈表皮粗糙处蛀入做横向环形蛀道，然后在蛀道内越冬。危害特征双齿长蠹是近年来危害园林树木比较严重的一种钻蛀性害虫，以成虫和幼虫危害树木的枝干部位，初孵幼虫沿枝条纵向蛀食初生木质部，随着龄期的增大逐渐蛀食心材，成虫蛀入枝干后紧贴韧皮部环食一周形成环形坑道。并且有

反复取食习性。