

# 山东西府海棠基地 山东西府海棠 泰景苗木

产品名称	山东西府海棠基地 山东西府海棠 泰景苗木
公司名称	泰安市泰山区泰景苗木基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄镇北十里河西村
联系电话	15153815381 15153815381

## 产品详情

### 移植前修剪

在移植大苗的前半年，山东西府海棠基地，先进行一次切根，这样可以大大减少根系的损伤。切根范围因树种不同而不同，阔叶树的切根范围以略大于树冠直径为准。在移栽常绿针叶树种的大苗之前，对油松、白皮松、五针松等树冠宽阔的树种，切根的范围应比树冠直径大1/3左右；对桧柏、侧柏、龙柏等树冠呈柱形或圆锥形的树种，切根范围应为树冠直径的一倍左右。

### 绿化苗木秋季养护管理

- 1、及时灌溉：苗木速生期浇水要采取多量少次的方法。每次灌溉要灌透、灌匀，防止冲刷幼苗，伤害苗茎、苗根。每次追肥均应随即浇水，若天降雨，墒情较好，则不要浇水。在苗木生长后期，应适当控制浇水(除特别干旱外，一般不需灌溉)。若苗木冬前不出圃，山东西府海棠种植基地，一定要浇好越冬水。
- 2、清除杂草：苗圃畦中多半盖有地膜，一般不用中耕，拔除杂草即可。拔除幅内杂草时，操作要细致，不要伤苗。若采用除草剂灭草要先试验，以免发生药害。畦埂及两侧，要在每次降雨或浇水后划锄保墒一次，山东西府海棠，同时除去杂草。对不覆盖地膜的，中耕可以疏松土壤，减少蒸发，起到抗旱保墒作用。通常每次降雨或浇水后要及时中耕除草。中耕要逐次加深，但不要伤苗、不要压苗。

### 西府海棠枝溃疡病

该病又称芽腐病、梭斑病。

症状：主要为害枝条，以2-3年枝条受害重。初生红褐色的圆形小斑点，渐扩大，中央凹陷，边缘隆起，呈梭形。病斑产生裂缝，空气潮湿时，裂缝四周产生白色霉状物，即病菌分子孢子座。后期，病疤上环死皮层脱落，木质部裸露，四周产生隆起的愈伤组织。翌年，病斑继续向外蔓延为害，病斑呈梭形同心轮纹状，年复一年地成圈扩展。

病原：病原菌为NectriagalligenaBres.称仁果癌丛赤壳菌，属子囊菌亚门真菌；无性世代Cylindrosporiummali称仁果干癌柱孢霉，属间知菌亚门真菌。

山东西府海棠基地-山东西府海棠-泰景苗木由泰安市泰山区泰景苗木基地提供。泰安市泰山区泰景苗木基地是一家从事“樱花,海棠,红叶李,紫叶李,白皮松,云杉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泰景苗木”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泰景苗木在花木中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！