

# 山东5公分樱花苗 泰景苗木 山东5公分樱花苗种植基地

产品名称	山东5公分樱花苗 泰景苗木 山东5公分樱花苗种植基地
公司名称	泰安市泰山区泰景苗木基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄镇北十里河西村
联系电话	15153815381 15153815381

## 产品详情

樱花树苗树高zui高可达6米，胸径11厘米，樱花树初春开花，常见的花朵颜色有白色、红色、粉色，颜色鲜艳亮丽，非常漂亮；樱花树适合种植在乡道、公园、宿舍楼前面当作道路绿化树，能够单株和成批种植于广场周边、角落草坪、花坛等作为风景带供参观，特别引人注目。

樱花树苗的繁殖流程有树条扦插、嫁接、田间种植、压条等，基地常使用的是树条扦插育苗，樱花树的树杆移植非常重要，如要1.1米开枝，则要定杆2.0米，1.2米开枝，则树杆1.1米；因为保证树杆通直，树苗的次移植株行距俺是60\*140种植，留存地方能够长至3~3厘米，就要再次移植，一棵优良的小苗，要修整3次以上的冠形，才可种植出优美的树形。

### 细菌性穿孔病

1、症状：病害首要发生在叶片上，枝梢也能受侵染。叶片起头呈现水渍状小褐点，尔后扩展成圆形或多角形病斑，褐色或紫褐色，病斑周围有黄绿色晕圈。潮湿情形下，病斑后背有浅黄色菌溢，山东5公分樱花苗，后期病斑脱落形成穿孔。枝梢受害后形成黑色凹陷而且龟裂。

2、发生纪律：病菌在枝梢病斑和病芽内越冬，春季靠风雨和昆虫传布阴雨连缀或蚜虫、叶蝉为害严重时轻易造成病害风行。

3、防治体例：

合理修剪，增添通风透光；合理施肥，增强发展势。

春季发芽前喷洒波尔多液，覆灭病原。

发病初期喷洒多菌灵、可杀得等药剂防治。

### 褐斑穿孔病

1、叶部初起褐色、灰褐色或紫褐色小点，逐渐形成圆形斑，非水渍状，不透明，病斑周围无黄绿色晕圈，直径2~4mm，病斑鸿沟清楚，外围紫褐色。后期中部白或褐色，略带轮纹，病斑枯死脱落，形成犯警则的穿孔。

2、发生纪律：病菌在落叶上越冬，翌年春季借风雨传布。6月起头发病，8~9月为发病盛期，降雨量年夜则病害发生与风行，树势虚弱，发病严重。

3、防治体例：

连系冬季修剪整枝，剪除病枝，断根枯枝落叶，削减侵染源。

春季树发芽前喷洒石硫合剂进行呵护。

6月发病初期喷洒瑞毒霉锰锌、加瑞农、等药剂防治。

### 樱花树种植方法

1、挖穴栽种：樱花树栽植前要把地整平，可挖直径0.8米、深0.6米的坑，坑里先填入10公分的有机肥，把苗放进坑里，使苗的根向四周伸展。填土后向上提一下苗使根深展开，再进行踏实。栽植深度在离苗根上层5厘米左右，栽好后浇水，山东5公分樱花苗种植基地，充分灌溉，用棍子架好，以防大风吹倒。

2、合理浇水：樱花树定植后苗木易受旱害，除定植时充分浇水外，以后8~10天浇水一次，保持土壤潮湿但无积水。灌后及时松土，用草将地表薄薄覆盖，减少水分蒸发。在定植后2~3年内，为防止树干干燥，可用稻草包裹。但2至3年后，树苗长出新根，山东5公分樱花苗装车价，对环境的适应性逐渐增强，则不必再包草。

3、适时施肥：樱花每年施肥两次，以酸性肥料为好。一次是冬肥，在冬季或早春施用豆饼、鸡粪和腐熟肥料等有机肥。另一次在落花后，施用硫酸铵、过磷酸钙等速xiao肥料。一般大樱花树施肥，可采取穴施的方法，即在树冠正投影线的边缘，挖一条深约10厘米的环形沟，将肥料施入，山东5公分樱花苗销售基地，既简便又利于根系吸收，以后随着树的生长，施肥的环形沟直径和深度也随之增加。

山东5公分樱花苗-泰景苗木-山东5公分樱花苗种植基地由泰安市泰山区泰景苗木基地提供。山东5公分樱花苗-泰景苗木-山东5公分樱花苗种植基地是泰安市泰山区泰景苗木基地今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。