

树状月季的种植 树状月季 山林月季

产品名称	树状月季的种植 树状月季 山林月季
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

产品详情

培养干形当种植树状月季成活后，应当按时做好枝芽修剪的工作，保证其中一个处于向上垂直的生长状态，树状月季的种植，主干选择枝条健壮的，注意水肥管理，确保有充足的营养与水分供应，促进主干快速生长，当其长到1.5m的高度时即可，若是1年中其生长高度较低，则第二年应当保留顶芽，将其他芽去除，确保主枝能够向上生长。

冠形培育侧枝生长达到标准后，从侧枝30cm位置将剩余部分截断。各个侧枝截断处留下芽3~5个，将其余芽清理干净，侧枝处还可以保留小分枝3~5个，成为3股9杈29头的树状月季，此为月季的整体外形，在此基础上将多余树枝去除，多次摘心处理，增加树头的枝条数量，后构成球形。

养护每次开花后保留主枝干2个及以上的复叶，温度控制约为20℃，确保树状月季一年四季均能开花。病虫害主要针对蚜虫，可使用菊酯类药消灭害虫。

位于我国月季天堂--南阳市，这儿土地资源富饶，气候适合，所繁殖的月季苗木涨势健壮，树状月季，抵抗性强，融入在我国南北方气候不一样的地域。年产量树状月季、大花、藤本植物等各种月季之上规范苗200万株之上，各种树状月季盆栽植物月季一百万盆，商品远销中国各省。一直以来坚持不懈顾客，诚实守信高于一切的标准，与中国各省好几家公司创建了长期性的合作关系。热忱热烈欢迎社会各界盆友前去参观考察、调查、商谈业务流程。

将带芽眼的树状月季枝条裁成七八厘米长度，下边斜切一刀，长度三厘米上下，外露枝干的形成层，再在对面一样斜切一刀，长度两厘

将树状月季接穗插进砧木，事先剥掉的槽里边，刀削面长的在木质部一面，短的在树根一面，在木质部面留3mm的刀口在砧木上，称为留白艺术，有利于接穗同砧木的痊愈。后用嫁接膜或是塑料薄膜用劲缠好接穗和砧木，让他们充足触碰，留意缠的情况下不必让她们的连接位置移位，一般缠双层就可以了，太厚不利痊愈。缠的不用过紧，使相接处不必让降水进到就可以了。假如想多嫁接法好多个种类，在砧

木上反复这好多个流程就可以了。

树状月季关键病害防治

提升树状月季种植管理方法，避免偏施基肥；春、夏梢抽发期和花瓣完善前，可采用代森锰锌、松树枝酸铜、代森锌、百菌清等喷布树干，半个月上下喷一次，持续3-4次。

树状月季脚腐病

立即排水管道，改进园里透光性自然通风标准，提升对天牛和别的的树杆虫害的防治；对已感病主茎，树状月季用什么砧木，可以用抗病性粘木接换砧。药剂避免：刮除病斑后上药，树状月季图片，常见药剂有三、托布津等。

螨类

（柑橘飞虱、四斑黄搜索引擎蜘蛛锈壁虱）。盛开前后左右（3-5月）和秋天（9-11月）是防治飞虱的关键阶段：花时虫口相对密度达1-2头/叶，花谢和秋天达5-6头/叶即需开展防治。常见药剂有螨酮、达螨灵、炔螨特、螨酯、双甲咪等，留意维护长须螨、钝螨、食螨瓢虫、日己方头甲和草蛉等克星。

蚧类

（矢尖蚧、红蜡蚧、吹棉蚧等）。防治关键阶段：矢尖蚧为第yi代幼虫期，红蜡蚧为幼虫期很多上梢危害阶段（一般为5月上、中下旬至6月中下旬），吹棉蚧为幼虫盛发环节。常见药剂阴啉酮、杀扑磷、碱、乐斯本、汽车机油溶剂等。留意改进园里自然通风透光性标准；维护和运用日己方头甲、小红点唇瓢虫、草蛉、金子蚜小蜂、澳大利亚瓢虫、大红色瓢虫等克星。

潜叶蛾

防治的关键阶段为夏、秋梢抽发期（7月上旬）。立即清掉零星抽发的夏秋季梢，融合液肥管理方法，促进主茎抽发的新梢健硕齐整。药剂防治：新梢抽发至1-2cm时打药，7-10天喷一次，持续2-3次。常见药剂有阿维菌素、杀螟丹、氯氟菊酯等。

天牛类

5-8月，大晴天下午人力星天牛和绿桔天牛若虫，黄昏褐天牛若虫；立即消除幼虫、初孵幼虫和剪去遇害枝杈；用棉絮或纯棉纱淋湿等灭虫剂吡菌胺后阻塞虫孔，再将虫孔用土壤封闭式，以幼虫。

树状月季的种植-树状月季-山林月季(查看)由南阳市卧龙区山林月季种植合作社提供。行路致远，砥砺前行。南阳市卧龙区山林月季种植合作社致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事丰花月季，南阳丰花月季，河南丰花月季的厂家，欢迎来电咨询。