

# 盆栽树状月季 舟山树状月季 山林月季种植

产品名称	盆栽树状月季 舟山树状月季 山林月季种植
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

## 产品详情

### 嫁接后树状月季的养护

- 1、避免淋雨。在树状月季嫁接好以后还要注意养护，在阴雨天气要避免淋雨，平时浇水时也不要把手淋到接口处，短时间内要防止强光直晒，可以放在散光处养护。
- 2、减少对树状月季的搬动。树状月季嫁接完成后把盆栽放在一个地方，尽量不要去搬动它，在养护时也要注意，不要触碰接穗，此时接口还没有愈合，经常搬动或触摸会影响正常生长愈合。
- 3、树状月季正常成活。那么在嫁接好以后，什么时候才能算是正常成活了呢？月季嫁接后一般一周左右就能愈合，如果经过一周的观察，接芽还是新鲜的，没有出现萎焉萎焉，就已经基本可以确定成活。但此时不要给接口接绑太早，等到新芽长得10厘米左右时再解开也不晚。

### 树状月季关键病害防治

提升树状月季种植管理方法，避免偏施基肥；春、夏梢抽发期和花瓣完善前，可采用代森锰锌、松树枝酸铜、代森锌、百菌清等喷布树干，半个月上下喷一次，持续3-4次。

### 树状月季脚腐病

立即排水管道，改进园里透光性自然通风标准，提升对天牛和别的的树杆虫害的防治；对已感病主茎，可以用抗病性粘木接换砧。药剂避免：刮除病斑后上药，常见药剂有三、托布津等。

### 螨类

（柑橘飞虱、四斑黄搜索引擎蜘蛛锈壁虱）。盛开前后左右（3-5月）和秋天（9-11月）是防治飞虱的关键阶段：花时虫口相对密度达1-2头/叶，花谢和秋天达5-6头/叶即需开展防治。常见药剂有螨酮、达螨灵

、蚜螨特、蚜酯、双甲咪等，盆栽树状月季，留意维护长须蚜、钝蚜、食蚜瓢虫、日己方头甲和草蛉等克星。

## 蚧类

（矢尖蚧、红蜡蚧、吹棉蚧等）。防治关键阶段：矢尖蚧为第yi代幼虫期，红蜡蚧为幼虫期很多上梢危害阶段（一般为5月上、中下旬至6月中下旬），吹棉蚧为幼虫盛发环节。常见药剂阴啉酮、杀扑磷、碱、乐斯本、汽车机油溶剂等。留意改进园里自然通风透光性标准；维护和运用日己方头甲、小红点唇瓢虫、草蛉、金子蚜小蜂、澳大利亚瓢虫、大红色瓢虫等克星。

## 潜叶蛾

防治的关键阶段为夏、秋梢抽发期（7月上旬）。立即清掉零星抽发的夏秋季梢，树状月季报价，融合液肥管理方法，促进主茎抽发的新梢健硕齐整。药剂防治：新梢抽发至1-2cm时打药，7-10天喷一次，持续2-3次。常见药剂有阿维菌素、杀螟丹、氯氟菊酯等。

## 天牛类

5-8月，大晴天下午人力星天牛和绿桔天牛若虫，黄昏褐天牛若虫；立即消除幼虫、初孵幼虫和剪去遇害枝杈；用棉絮或纯棉纱淋湿等灭虫剂吡菌胺后阻塞虫孔，再将虫孔用土壤封闭式，以幼虫。

树状月季，又称月季树、玫瑰树。是一个直立树干，舟山树状月季，通过园艺手段：扦插、养眼、育干、嫁接、修剪、整型等措施，生产出来的一种新型月季类型。树状月季，形状，优雅典雅，树状月季养殖，层次分明，在视觉效果上令人耳目一新。造型多样：有圆球型、扇面型、瀑布型、盆栽微型等。其特点：既保留了一般月季香浓、花期长、花大色艳等优点，又增加了新颖、热烈的氛围，更具有审美价值。树状月季在环城行道，公园、风景区、小区庭院等绿化地带栽培，可起到画龙点睛的效果。

盆栽树状月季-舟山树状月季-山林月季种植(查看)由南阳市卧龙区山林月季种植合作社提供。南阳市卧龙区山林月季种植合作社在花木这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山林月季一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李长华。同时本公司还是从事丰花月季，南阳丰花月季，河南丰花月季的厂家，欢迎来电咨询。