

上海劳保交易会

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上海劳保交易会 |
| 公司名称 | 上海贸升展览服务有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海嘉定区新源路66弄世昶广场21号1001（一部） |
| 联系电话 | 17315583638 17315583638 |

产品详情

医用防护用品展了解到，8月18日，松江区中心医院报告1名工作人员例行核酸检测结果异常，经市、区疾控中心复核，其核酸检测结果为阳性。

8月11日，南京公卫医疗中心ICU病房一名护士在例行核酸检测中结果阳性。南京市卫健委副主任丁小平说，“目前怀疑是在护理患者的过程中，发生了职业暴露”。

7月31日，河南郑州出现本土32例新冠肺炎感染者，主要发生在作为境外输入定点收治医院的郑州市第六人民医院，涉及人群包括保洁人员、医务人员，呈现局部散播状态。郑州市疾控中心主任王松强在疫情防控新闻发布会上表示，此次疫情的发生，既暴露院感控制方面带来的不利影响，也暴露出少数医院在落实院感控制方面存在一定的漏洞。

职业暴露是指因职业关系导致暴露在危险因素中，从而出现可能损害健康或危及生命的一种情况。对医务人员来说，就是在从事诊疗或护理活动过程中接触有毒、有害物质，或传染病病原体，导致损害健康或危及生命的一类职业暴露。

新冠变异株具有极强的感染能力，医护人员尤其要做好保护措施。在治疗护理COVID-19患者期间，医用防护用品展认为，应做好以下几个方面的防护。

1.规范佩戴手套

选择大小合适的手套，佩戴过程避免过度牵扯使手套变形或破损；操作过程中手套避免直接接触尖锐物尖端，导致手套破损或刺伤手指。

2.选择合适的隔离衣

由于目前尚无医用隔离衣的国家或行业标准，建议医护人员根据实际应用场景选择抗渗水性合适的隔离衣。

3.规范穿戴防护服

进入隔离区前要确保所穿防护服合适，且符合《医用一次防护服技术要求（GB19082—2009）》相关要求。穿前检查防护服完好无破损，避免暴露。应不携带手机，因为不方便，还可能增加感染风险。

4.正确佩戴防护面罩、面屏或护目镜

正确佩戴医用防护面罩、面屏或护目镜可防止体液（血液、组织液等）、分泌物等溅入脸部或眼睛。医用防护面罩、面屏或护目镜应选择符合《个人用眼护具技术要求（GB14866-2006）》相关要求。如护目镜起雾可选用防雾喷剂，也可通过提高室温避免。

5.正确佩戴防护口罩

根据风险情况选择符合《医用防护口罩技术要求（GB19083 - 2010）》或《医用外科口罩YY0469 - 2011》相关标准的口罩。戴前检查口罩完好无损，戴后应检查气密性。建议每次使用 1 个，因为一次戴多个口罩只会破坏口罩结构的气密性并增加不适感，但不会叠加防护效果。

6.在进入洁净区或污染区时均应戴防护帽。