

# 丛生小叶鸡爪槭 大兴安岭地区丛生鸡爪槭 佳邦

产品名称	丛生小叶鸡爪槭 大兴安岭地区丛生鸡爪槭 佳邦
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

## 产品详情

植物生长都有各自的特点，但是唯独一点是不会变的，不管是什么植物它的养护管理是重中之重，鸡爪槭4月开花，双翅果较小，嫩叶青绿色，秋天转红，灿烂如朝霞，非常赏心悦目，所以以下几点养护管理整理给大家。

**放置场所：**鸡爪槭宜放置在通风透光、温暖湿润之处。夏季要适当遮荫，丛生鸡爪槭图片，防止在烈日下曝晒。但秋季叶色转红者，又需有充分光照，入秋才能变红。冬季放进室内即可，丛生鸡爪槭和鸡爪槭差别，防止盆土干冻。

**浇水：**平时宜保持盆土湿润，丛生小叶鸡爪槭，尤其在发芽放叶期，不可偏干。入秋后，叶色转红，盆土以偏干为宜。夏季浇水宜在早晚，避免使土温发生急剧变化，大兴安岭地区丛生鸡爪槭，影响根系生理作用。入秋后以稍干为宜。

**施肥：**春夏季在生长旺盛期，可经常施用稀薄的肥水，并注意增加磷、钾肥的成分，才有利于叶色的艳丽。如肥料不足，入秋寒霜侵袭时，常不能红变，而陷于落叶。

**修剪：**多在落叶后休眠期进行，剪去病弱枝、交叉枝、平行枝及重叠枝，还须结合树形将当年生的过长枝条截短，一般每枝留1~2个节即可。在生长期不宜修剪，以免树液从伤口外流，影响生长。

**翻盆：**每隔2~3年进行一次，在发芽期前翻盆，去除1B2旧土，换以肥沃疏松的腐叶土或塘泥土，掺拌适量的砗糠灰及砂土即可。

**病虫害防治：**鸡爪槭的主要病害有褐斑病、病，可喷洒波尔多液或石硫合剂进行防治。虫害主要有刺蛾、蓑蛾及天牛等，可用80%乳剂1500倍液喷杀之。

现在很多的人都会选择种植鸡爪槭，鸡爪槭出现在我们生活的各处。鸡爪槭的叶子形状看起来很像枫叶，其叶形美观，入秋后转为鲜红色，色艳如花，灿烂如霞，为优良的观叶树种。鸡爪槭可作行道和观赏树栽植，是较好的“四季”绿化树种。我们在种植鸡爪槭时，有很多需要注意的地方，其中的浇水工作就是一方面。下面来说说鸡爪槭应该如何浇水。

鸡爪槭在生长期保持土壤潮湿就可以了，浇水要浇透了，不能有积水的出现。在幼苗的时期对水的需求量不是很大，随着植株的生长对水需求量会增加，所以浇水需要观察植株的生长状况来决定。在春秋季节每隔每隔2~3天浇一次水。在夏季每天浇一次水，每天可以对植株叶片和周围喷水两次。在冬季每隔10天浇一次水。鸡爪槭在刚刚定植完成时，需要浇一次水，浇水要浇透，浇到水能够渗透到土壤底部为止。在春秋两季，每隔2~3天浇一次水，在夏季每天浇一次水，天气过于炎热时，可以对植株叶片和周围进行喷水，在冬季每隔10天浇一次水。

小鸡爪槭（变种）（植物分类学报）簕衣槭（江苏南部种子植物手册）该变种较之原种区别在于本变种的叶较小，直径约4厘米，常很深地7裂，裂片狭窄，边缘具锐尖的重锯齿，小坚果卵圆形，具短小的翅。产山东、江苏、浙江、福建、江西、湖南等省。分布于日本。模式标本采自日本。

该种在各国早已引种栽培，变种和变型很多，其中有红槭（变型）和羽毛槭（变种）均在中国东南沿海各省庭一园中已经广泛栽培。

丛生小叶鸡爪槭-大兴安岭地区丛生鸡爪槭-佳邦由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园为客户提供“榉树，乌桕，丛生朴树，丛生女贞，池杉，落羽杉，高杆红叶石楠”等业务，公司拥有“榉树，乌桕，丛生朴树，丛生女贞”等品牌，专注于花木等行业。，在句容市茅山镇何庄小路岗28号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：纪先生。