

丛生鸡爪槭退林还耕 河北丛生鸡爪槭 佳邦

产品名称	丛生鸡爪槭退林还耕 河北丛生鸡爪槭 佳邦
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

产品详情

化学成分

叶含：杜荆素（vitexin），丛生鸡爪槭退林还耕，肥皂草甙（saponarin），荭草素(orientin)，合模荭草素（homoorientin），矢车菊素单糖甙（cyanidin monoglycoside），飞燕草素单糖甙（delphinidin monoglycoside），芍药素单糖甙（peonidin monoglycoside）。

实用价值

用途

【药材基源】：为槭树科植物鸡爪槭的枝、叶。夏季采收枝叶，晒干，切段。

【性味】：辛、微苦，平。【功效】；痈肿发背。

【用法用量】：内服：煎汤，5-10g。外用：适量，煎水洗

春季鸡爪槭叶色黄中带绿，性状奇特的叶片在阳光的照射下，无论是桃红柳绿，抑或是粉墙黛瓦，都能映衬得体。此时的鸡爪槭呈现出暖色系特征。活跃明朗又轻盈。夏季鸡爪槭变得密实，树形从春日的疏枝弱弱转为浓荫，叶色转为深绿，丛生鸡爪槭效果，呈现出冷色系特征，给炎炎夏日带来清凉。鸡爪槭引人注目的观赏特性是叶色富于季相变化。同理论色彩一样，叶片的颜色也具有冷暖之分：暖色在色彩距离上，使人感觉靠近，而冷水给人的感觉则是后退和远离。在心理感觉上，暖色调使人紧张，兴奋，可营造轻松愉快的空间氛围；而冷水调使人宣传教育平和，可营造安宁，幽远的空间氛围。

春季鸡爪槭叶色黄中带绿，性状奇特的叶片在阳光的照射下，无论是桃红柳绿，抑或是粉墙黛瓦，都能映衬得体。此时的鸡爪槭呈现出暖色系特征。活跃明朗又轻盈。夏季鸡爪槭变得密实，树形从春日的疏枝弱弱转为浓荫，河北丛生鸡爪槭，叶色转为深绿，呈现出冷色系特征，给炎炎夏日带来清凉。

但因鸡爪槭树形体量并不高大，难以形成良好的树荫，同时叶色过于浓重，只能成为空间中的景或背景

。观赏效果逊于春秋两季。

鸡爪槭(*Acer palmatum* Thunb)又名鸡爪枫,属槭树科、槭树属落叶小乔木或乔木,树冠伞形,姿态雅丽。树皮平滑.小枝红棕色。叶对生,掌状7~9裂,基部截形成*形.裂片先端尾状,边缘有不整齐锐齿或重锐齿,嫩叶密生柔毛,老叶平滑*。花杂性,丛生鸡爪槭供应商,由紫红小花组成伞房花序,4月开放。翅果展成钝角,向上弯曲,10月成熟,棕黄色。砧木生长旺盛时嫁接。小苗须经过2-3次移植。移植在落叶后至萌动前进行,需带宿土。嫁接可用切接、靠接及芽接等法,砧木一般常用3~4年生之鸡爪槭实生苗。切接在春天3~4月砧木芽膨大时进行,砧木好在离地面50~80cm处截断进行高接,这样当年能抽梢长达50cm以上。靠接虽较麻烦,但易保证成活。芽接根据南京经验,时间以5、6月间或9月中、下旬为宜。5、6月间正是砧木生长旺盛期,接口易于愈合,春天发的短枝上的芽正适合芽接;而夏季萌发的长枝上的芽正适合在9月中、下旬接于小砧木上。秋季芽接应适当提高嫁接部位,多留茎叶,能提高成活率。鸡爪槭定植后,春夏间宜施2~3次肥,夏季保持土壤适当湿润,入秋后土壤以偏干为宜。丛生鸡爪槭退林还耕-河北丛生鸡爪槭-佳邦(查看)由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园位于句容市茅山镇何庄小路岗28号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前佳邦在花木中享有良好的声誉。佳邦取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳邦全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。