

桂花的功效与作用 景德镇桂花 佳邦

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 桂花的功效与作用 景德镇桂花 佳邦 |
| 公司名称 | 句容市茅山镇佳邦苗木种植园 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 句容市茅山镇何庄小路岗28号 |
| 联系电话 | 13062910666 13062910666 |

产品详情

桂花树装运

土球包扎好后，桂花树图片，需求启运。如土球较大，则应在移出苗穴的一面开好斜坡口，以便将桂花树拖引出苗穴。如用轿车装运大桂花树，应将植株根部朝车辆前进方向歪斜放置；必要时盖以防雨布，以防大雨淋刷土球。如装载较大桂花树植株，须将有些树冠或树干支架在轿车挡板上时，在其下方衬以稻草等软质垫物，并用绳子缚稳，以防干枝冲突受伤。土球两边则须塞以木头或石块，以防土球翻滚磕碰而松懈。

在全部大桂花树的装运过程中，要严格做到轻抬、轻装、轻卸放，避免弄破土球，损伤树体。树苗上车后，要对大的树冠进行绑缚，并加盖遮阳网，喷水保湿，沿途留意维护，桂花树，避免磕碰擦伤树枝以及呈现别的不必要的事故。

大桂花树运到现场今后，若不能及时栽种，需随时将土球用稻草等掩盖物盖好，避免酷日暴晒或风吹雨淋，并争夺尽快栽植。

桂花树三个重要时期的养护 1、低温期（12月至次年2月）：此期营长与生殖生长同时共生，嫩梢、叶腋间花不断。平均气温7 以上时，枝梢开始生长，并生长出幼嫩花枝花序和营养枝花序。花枝花序叶片退化，枝长1厘米至5厘米，着生大小花蕾20至30余个。营养枝花序有叶片2片至8片，也着生大小花蕾6至20余个，分生在紫红色嫩枝梢叶腋上。同时，木质化枝叶腋已形成的花芽也先后开放出叶腋花，全为聚伞花序状。此期花为白色，花径4毫米至6毫米，香气稍淡。

2、适温、繁花期（3月至4月和9月至11月）：3、4月气温回升，此时叶腋花与嫩梢花同时开放，香气转浓。9月，气温降到20 左右时，新梢先后木质化，出现以木质化叶腋花序为主。木质化枝对生叶腋分生的多个复芽花序，陆续放花，繁花连续盛开。此时花色淡黄，花径6毫米至10毫米。因花量较大，气温适宜，芳香物发散量也大，因而香味很浓。 3、高温期（5月至8月）：当气温22 以上时，已现花芽（蕾

)的夏梢，因气温高，营长迅速，花芽受到抑制，幼梢新梢现蕾而不现花。气温25 以上花蕾消失，新梢幼梢无蕾也无花。但若出现阴雨天气，也可出现腋花，而成龄树主、侧枝老茎干上，仍有少量不定花开放。此期是日香桂淡花季节，但因气温较高，出现的腋花和不定花香气却十分浓郁而幽远。日香桂的生态学特性可概括为：适于年均温10 至15 、温 - 2 、温不超过25 的地方种植。喜阳光充足、温凉多湿的气候，适应性广，抗逆性强，在中性偏酸富含有机质的土壤上生长良好，枝茂花繁。它既可作园林绿化树种，还可作香料植物、药用植物栽培。

桂花适宜栽植在通风透光的地方;喜欢洁净通风的环境，受害后往往不能开花;畏淹涝积水，若遇涝渍危害，桂花的功效与作用，则根系发黑腐烂，叶片先是叶尖焦枯，随后全叶枯黄脱落，进而导致全株死;不很耐寒，但相对其它常绿阔叶树种，还是一个比较耐寒的树种。

常见的栽培品种有波叶金桂、丹桂、硬叶丹桂、早银桂、杭州黄、四季桂、佛顶珠、日香桂等。

波叶金桂：叶椭圆形，边缘波状起伏，秋季可开花2-3次，着花紧密，有浓香，花冠金黄色，花瓣椭圆形。

丹桂：叶卵状椭圆形，坚挺金缘，秋季开花2次，花淡香，花冠深红色，花瓣圆形。

硬叶丹桂：叶椭圆形或椭圆状披针形、全缘或1/3或2/3有锯齿，边缘波状花淡香，花冠橙黄色。

早银桂：叶椭圆形、全缘、边缘平直，花期较早，一年可开花3-4次，花浓香，花冠淡黄色，景德镇桂花，花瓣圆形。

晚银桂：叶缘微波曲，基本全缘偶先端有粗尖锯齿。叶面微凹，叶先端短尖，基部宽楔形。一年可开花2次，花期9月下旬与10月上旬，持续6天，每花序有花6~7朵，着花中等，香气中等。花瓣圆形，四裂几全裂，花冠近白色，平展，雄蕊2，子房退化。

桂花的功效与作用-景德镇桂花-佳邦由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。桂花的功效与作用-景德镇桂花-佳邦是句容市茅山镇佳邦苗木种植园今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：纪先生。