

# 佳邦 乌桕根皮 乌桕

产品名称	佳邦 乌桕根皮 乌桕
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

## 产品详情

乌桕，高可达15米许，各部均而具乳状汁液；树皮暗灰色，有纵裂纹；枝广展，具皮孔。叶互生，纸质，叶片菱形、菱状卵形或稀有菱状倒卵形，长3-8厘米，宽3-9厘米，顶端骤然紧缩具长短不等的尖头，基部阔楔形或钝，乌桕树.，全缘；中脉两面微凸起，侧脉6-10对，纤细，斜上升，离缘2-5毫米弯拱网结，网状脉明显；叶柄纤细，长2.5-6厘米，顶端具2腺体；托叶顶端钝，长约1毫米。花单性，雌雄同株，聚集成顶生、长6-12厘米的总状花序，雌花通常生于花序轴下部或罕有在雌花下部亦有少数雄花着生，雄花生于花序轴上部或有时整个花序全为雄花。雄花：花梗纤细，长1-3毫米，向上渐粗；苞片阔卵形，长和宽近相等约2毫米，顶端略尖，基部两侧各具一近形的腺体，每一苞片内具10-15朵花；小苞片3，不等大，边缘撕裂状；花萼杯状，3浅裂，裂片钝，具不规则的细齿；雄蕊2枚，罕有3枚，伸出花萼之外，花丝分离，与球状花药近等长。雌花：花梗粗壮，长3-3.5毫米；苞片深3裂，裂片渐尖，基部两侧的腺体与雄花的相同，每一苞片内仅1朵雌花，间有1雌花和数雄花同聚生于苞腋内；花萼3深裂，裂片卵形至卵头披针形，顶端短尖至渐尖；子房卵球形，平滑，3室，花柱3，基部合生，柱头外卷。蒴果梨状球形，成熟时黑色，直径1-1.5厘米。具3种子，分果片脱落后而中轴宿存；种子扁球形，黑色，长约8毫米，宽6-7毫米，外被白色、蜡质的假种皮。花期4-8月。

### 丛生乌桕栽种时间方法

#### 1、选地

丛生乌桕对于生长环境的要求并不是很严格，它在微酸性的土壤、中性土壤亦或是在盐碱地中都可以生长，所以种植地的选择相对宽泛一些，苗圃育苗的话要提前清园、整地、施肥，然后再准备栽种丛生乌桕。

#### 2、环境

丛生乌桕喜欢光照充足的环境，栽种的时候一定要考虑环境因素，种植地要向阳背风。乌桕的生长对温度要求是比较严的，15 以上的温度适合丛生乌桕生长，但温度好不要超过32 。

### 3、时间

春季是植物萌发期，很多植物都在这个时候种植，丛生乌桕也可以在春季的时候栽种，具体时间是3-4月份。

### 4、管理

丛生乌桕具有一定的耐湿性，它在积水较多的土壤中能生存一段时间，所以日常可以粗放管理，大田育苗的话需要定期进行水肥管理，还要松土、除草、防虫害等等。

苗木批发注意事项：

一、要买自己熟悉的品种市场苗木品种繁多，很多是同物异名，容易鱼目混珠，如丛生香泡与香泡，使人眼花缭乱，摸不清真相，上当受骗。因此，乌桕树价格，购买自己熟悉的品种，或直接到有母本园的育苗单位现场购苗，才能有把握，购到真品种。

#### 二、购苗要三看

1. 看苗木新鲜度所谓新鲜苗木，出圃周期短，叶片、根系新鲜有光泽，没有变色、皱缩、萎蔫、干枯、腐烂现象。如果叶片失绿出现皱缩卷筒，枝条产生皱皮，乌桕，根系失水干枯，多为苗木出土时间长，植株失水多，根系已，栽后很难恢复生长。

2. 看苗木质量选苗除品种纯正外，还要枝干粗壮，多分枝，枝叶无病虫害损伤，根系发达，主、侧根完整，损伤少，乌桕根皮，须根多。只有断头根、脱皮根，没有须根，多为扯出来的苗木，栽后吸收水分困难，容易。

3. 看芽的发育情况不同温度带地区的苗木，发芽早晚不同，要根据种植时间选购苗木。一般深休眠的苗木，栽后成活率较高。已萌芽长叶的苗木，栽后根系恢复生长慢，水分营养代谢失调，一般成活率较低。如平均气温在5℃以下，种植裸根常绿树苗难以成活，已发芽的黑松、马尾松、五针松裸根移栽很难成活。月季移栽不能晚于惊蛰，牡丹移栽要在秋分。所以，购苗要选择时间，已发芽抽梢的苗木不要购买，尤其是纯单芽和隐芽少的观花、观果苗，很难成活。

佳邦(图)-乌桕根皮-乌桕由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园是江苏镇江,花木的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳邦更加美好的未来。