佳邦 乌桕根皮 乌桕

产品名称	佳邦 乌桕根皮 乌桕
公司名称	句容市茅山镇佳邦苗木种植园
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市茅山镇何庄小路岗28号
联系电话	13062910666 13062910666

产品详情

乌桕,高可达15米许,各部均而具乳状汁液;树皮暗灰色,有纵裂纹;枝广展,具皮孔。叶互生,纸质,叶片菱形、菱状卵形或稀有菱状倒卵形,长3-8厘米,宽3-9厘米,顶端骤然紧缩具长短不等的尖头,基部阔楔形或钝,乌桕树.,全缘;中脉两面微凸起,侧脉6-10对,纤细,斜上升,离缘2-5毫米弯拱网结,网状脉明显;叶柄纤细,长2.5-6厘米,顶端具2腺体;托叶顶端钝,长约1毫米。花单性,雌雄同株,聚集成顶生、长6-12厘米的总状花序,雌花通常生于花序轴下部或罕有在雌花下部亦有少数雄花着生,雄花生于花序轴上部或有时整个花序全为雄花。雄花:花梗纤细,长1-3毫米,向上渐粗;苞片阔卵形,长和宽近相等约2毫米,顶端略尖,基部两侧各具一近形的腺体,每一苞片内具10-15朵花;小苞片3,不等大,边缘撕裂状;花萼杯状,3浅裂,裂片钝,具不规则的细齿;雄蕊2枚,罕有3枚,伸出于花萼之外,花丝分离,与球状花药近等长。雌花;花梗粗壮,长3-3.5毫米;苞片深3裂,裂片渐尖,基部两侧的腺体与雄花的相同,每一苞片内仅1朵雌花,间有1雌花和数雄花同聚生于苞腋内;花萼3深裂,裂片卵形至卵头披针形,顶端短尖至渐尖;子房卵球形,平滑,3室,花柱3,基部合生,柱头外卷。蒴果梨状球形,成熟时黑色,直径1-1.5厘米。具3种子,分果爿脱落后而中轴宿存;种子扁球形,黑色,长约8毫米,宽6-7毫米,外被白色、蜡质的假种皮。花期4-8月。

丛生乌桕栽种时间方法

1、选地

丛生乌桕对于生长环境的要求并不是很严格,它在微酸性的土壤、中性土壤亦或是在盐碱地中都可以生长,所以种植地的选择相对宽泛一些,苗圃育苗的话要提前清园、整地、施肥,然后再准备栽种丛生乌桕。

2、环境

丛生乌桕喜欢光照充足的环境,栽种的时候一定要考虑环境因素,种植地要向阳背风。乌桕的生长对温度要求是比较严的,15 以上的温度适合丛生乌桕生长,但温度好不要超过32 。

3、时间

春季是植物萌发期,很多植物都在这个时候种植,丛生乌桕也可以在春季的时候栽种,具体时间是3-4月份。

4、管理

丛生乌桕具有一定的耐湿性,它在积水较多的土壤中能生存一段时间,所以日常可以粗放管理,大田育苗的话需要定期进行水肥管理,还要松土、除草、防虫害等等。

苗木批发注意事项:

一、要买自己熟悉的品种市场苗木品种繁多,很多是同物异名,容易鱼目混珠,如丛生香泡与香泡,使人眼花?乱,摸不清真相,上当受骗。因此,乌桕树价格,购买自己熟悉的品种,或直接到有母本园的育苗单位现场购苗,才能有把握,购到真品种。

二、购苗要三看

- 1.看苗木新鲜度所谓新鲜苗木,出圃周期短,叶片、根系新鲜有光泽,没有变色、皱缩、萎蔫、干枯、腐烂现象。如果叶片失绿出现皱缩卷筒,枝条产生皱皮,乌桕,根系失水干枯,多为苗木出土时间长,植株失水多,根系已,栽后很难恢复生长。
- 2.看苗木质量选苗除品种纯正外,还要枝干粗壮,多分枝,枝叶无病虫损伤,根系发达,主、侧根完整,损伤少,乌桕根皮,须根多。只有断头根、脱皮根,没有须根,多为扯出来的苗木,栽后吸收水分困难,容易。
- 3.看芽的发育情况不同温度带地区的苗木,发芽早晚不同,要根据种植时间选购苗木。一般深休眠的苗木,栽后成活率较高。已萌芽长叶的苗木,栽后根系恢复生长慢,水分营养代谢失调,一般成活率较低。如平均气温在5 以下,种植裸根常绿树苗难以成活,已发芽的黑松、马尾松、五针松裸根移栽很难成活。月季移栽不能晚于惊蛰,牡丹移栽要在秋分。所以,购苗要选择时间,已发芽抽梢的苗木不要购买,尤其是纯单芽和隐芽少的观花、观果苗,很难成活。

佳邦(图)-乌桕根皮-乌桕由句容市茅山镇佳邦苗木种植园提供。句容市茅山镇佳邦苗木种植园是江苏镇江,花木的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在佳邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创佳邦更加美好的未来。